

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 07.03.2017/10813

Codlet®

Süspo Emülsiyon (SE)

Grubu O,4 B,2 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

452,42 g/L 2,4-D EHE + 6,25 g/L Florasulam

- Önce Etiketini Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin Tavsiye Edildiği Şekilde, Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi Üç Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi uyuşukluk. Deride ve gözde tahriş sebeptir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde, Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Hemen tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde, Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Ağız suyla iyice çalkalayın. Tıbbi yardım alın.
Cilt ile teması halinde, Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde, Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Doktor tavsiyesine göre destekleyici tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: 2,4-D Ethylhexyl ester, Florasulam, Su

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (H)

- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Bitki adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
BUĞDAY-ARPA	Kandamlası (<i>Adonis aestivalis</i>) Sığırdili (<i>Anchusa azurea</i>) Yatık Boya Kökü (<i>Asperula procumbens</i>) Taşkesen Otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>) Rum Yabancı Keteni (<i>Camelina rumelica</i>) Yabancı Tere (<i>Cardaria draba</i>) Boynuz Otu (<i>Cerastium dicotinum</i>) Uzun Süpürge Otu (<i>Descurania sophia</i>) Kıraç İtici (<i>Geranium stepporum</i>) Sarıkık Meyveli Yavruağı (<i>Hypericum pendulum</i>) Yabancı Çivit Otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Trakya Hardalı (<i>Neslia apiculata</i>) Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Uzun Meyveli Bülbül Otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>) Kaba Tüylü Fiğ (<i>Vicia narborensis</i>) Adi Fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	50 ml/da
	Tarla Papatyası (<i>Anthemis fumorifolia</i>) Saka Dikeni (<i>Carduus pinnoccephalus</i>) Tarla Hezeranı (<i>Consolida regalis</i>) Boynuzlu Yoğurt Otu (<i>Galium tricornutum</i>) Çoban Değneği (<i>Polygonum bellardii</i>) Tarla Düğün Çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Meryem Dikeni (<i>Silybum marianum</i>) Parmaklı Yavşan Otu (<i>Veronica triphyllas</i>)	60 ml/da
	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Kokarot (<i>Bifora radicans</i>) Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Doğu Ballıbabası (<i>Wiedemanian orientalis</i>)	70 ml/da
*MISIR	İmam Pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Uzun Loğusa Otu (<i>Aristolochia clematitis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yatık Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Dil Kanatan (<i>Galium aparine</i>) Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Gece Sefası (<i>Ipomea stolonifera</i>) Adi Soda Otu (<i>Salsola kali</i>) Köpek Üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	70 ml/da
	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Tarla Sarması (<i>Convolvulus arvensis</i>)	80 ml/da

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIRARICAN
Daire Başkanı

Dr. Ahmet ELMACI

ABG Enternasyonel
Kimya San. ve Ticaret Ltd. Şti.
Kemalpaşa V.D. 001 066 3319

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Codlet uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Hububat (Buğday-Arpa):

Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatin kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatin sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki anlamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır:

Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15°C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

Codlet®

Süspo Emülsiyon (SE)

Grubu O,4 B,2 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

452,42 g/L 2,4-D EHE + 6,25 g/L Florasulam

İLACIN ÖZELLİKLERİ:

- Sistemik ve kontakt etkili ve geniş spektrumlu bir herbisitir
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Her türlü yer aleti ile uygulanır. Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
- İlaçlamadan 2 saat sonra yağın yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
- Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için ilaçlamadan önce veya 2 saat sonra yağmurlama sulaması tavsiye edilir.
- Toprakta bakiye bırakmaz. Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.ToH.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com



Dr. Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

ABG Enternasyonel
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemalpaşa V.D. 001 066 3319

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
39 N

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Codlet adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 ve B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Codlet 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 ve B,2 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı yabancı ot ilaçlarıyla karıştırılması tavsiye edilmez. Azot, Fosfor ve Potas terkipli yaprak gübrelere ile karıştırılarak kullanılabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeniyle önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır. Başka ilaçlarla karıştırılmadan önce, çiftçinin kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.

Codlet®

Süspo Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----	-----------------------------

452,42 g/L 2,4-D EHE + 6,25 g/L Florasulam

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

39



Dr. Ahmet ELMACI
Teknik Müdür
ABG Enternasyonel
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemalpaşa V. P. 001 066 3319