

Fordus®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C: 11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
250 g/L Azoxystrobin		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Önemli miktarda bünnyeye alınmasını takiben mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı ile birlikte ishal görülebilir

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Ağız suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Eğer kolayca bulunabiliyorsa su yerine süt verin. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse kusmuğun akciğere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Hemen tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Cilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın. **Göz ile teması halinde;** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mideyi mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına dikkat ederek yıkayınız. Mangal kömürü ve bir müşşil ilacı veriniz. Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası : 19.04.2016/10605

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
BAĞ*	Bağ Mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
	Bağ Küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
	Bağda Ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)	75 ml/100 l su (Yaz uygulaması)	21 gün
HIYAR	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml/100 L su	3 gün
	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
KORNİŞON	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml/100 L su	3 gün
	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
KABAK	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
DOMATES (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
KARPUZ	Alternaria Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	75 ml/da	3 gün
BİBER (sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
ÇELTİK	Çeltik Yanıklık Hastalığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	100 ml/da	28 gün
ÇİLEK	Çilekte Antraknoz (<i>Colletotrichum fragariae, Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum acutatum</i>)	75 ml/da	1 gün
BEZELYE	Bezelye Mildiyözü (<i>Peronospora viciae</i>)	80 ml/da	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Azoxystrobin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H332** Solunması halinde zararlıdır.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH208 Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261** Buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA; Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Evcil hayvanları uygulama yapılmış sahadan uzak tutunuz.
- Yem ve gıda maddelerini bitki koruma ürünü ile kirlitemeyiniz.
- Uygulama esnasında mümkün olduğunca bitki koruma ürünü ile temastan sakınınız.
- Sulandırılmamış bitki koruma ürünü gözlerinizi ve derinizi tahriş edebilir.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Dr. Ahmet ELMACI
Tehnik Müdür

ABG Enternasyonel
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemalpaşa V.D. 001 060 3319

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Neşim ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

10 Aralık 2021

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyözü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama; çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. Uygulama; çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. Uygulama; çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve Diğer Uygulamalar; üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Ölükol:

Yaz uygulaması:

1. Uygulama; sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. Uygulama; sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. Uygulama; sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar-Kornişon - Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar, Kornişon ve Kabak - Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Fordus®

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	C3: 11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
250 g/L Azoxystrobin		

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

RUHSAT SAHİBİ FİRMA


ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

Dr. Ahmet ELMACI

Teknik Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Aralık 2021



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

ABG Enternasyonel
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemalpaşa V.D. 801 066 3319

Fordus®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3: 11	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	--------	-------------------------

250 g/l Azoxystrobin

Domates Mildiyösü: Uygulamaya çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Biberde (Sera) Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı: Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde yapılır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Çeltik Yanıklık Hastalığı: Yeşil aksam uygulamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde bitki koruma ürününün etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü uygulamalar yapılmalıdır.

Çilekte Antraknoz: Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk uygulamadan sonra 10 gün sonra 2.uygulama yapılmalıdır.

Bezelye Mildiyösü: Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında, günlük ortalama sıcaklığın 15 °C ve nisbi nemin %80'in üzerine çıkması durumunda ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya, çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Fordus'un tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Fordus adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Fordus 'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;11 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Fordus'un domatesteki uygulamalarında yayıcı yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi uygulanmalıdır.



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

10 Aralık 2021
GIDA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

Dr. Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

ABG Enternasyonel
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemalpaşa V.D. 001 066 3319