

Agrocrip®

İslanabilir Toz (WP)

Grubu	M:M4	G1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	------	-------------------------

% 70 Folpet + % 1,5 Triadimenol

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**İAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözler, deri, burun ve boğazda tahrişe neden olur. Yutulduğunda zararlı olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika boyunca suyla yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Herhangi bir spesifik antidotu yoktur. Mide lavajından önce mümkün olabilecek mukoza zararını kontrol et. Solunum ile alınmış ise, akciğer ödemi var mı gözle. Merkezi sinir sistemi simptomik etkilerine göre tedavi ediniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 06.05.2015/10234

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
DOMATES	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	200 g/100 Lsu	7 gün
BAĞ*	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	200 g/100 Lsu	sofralık 10 gün şaraplık 42 gün
	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	200 g/100 Lsu	sofralık 10 gün şaraplık 42 gün
	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 g/100 Lsu	sofralık 10 gün şaraplık 42 gün
	Bağ ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)	200 g/100 Lsu (yaz uygulaması)	sofralık 10 gün şaraplık 42 gün
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	200 g/100 Lsu	7 gün
	Külleme (<i>Podosphaera leucomyces</i>)	200 g/100 Lsu	7 gün
HIYAR (Tarla)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	200 g/100 Lsu	7 gün
	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 Lsu	7 gün
ŞEFTALİ	Şeftali yaprak kıvrıcıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	200 g/100 Lsu	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra aynı kaptanla karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Folpet, Triadimenol

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

Zararlılık ifadeleri (H)

- H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

Önlem ifadeleri (P)

- P271** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASı HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Çok sıcak ve kurak şartlarda ayrıca kültür bitkisi stres altındayken uygulanmamalıdır.

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest®
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

Agrocrip®

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	M:M4	G1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	------	-------------------------

% 70 Folpet + % 1,5 Triadimenol

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ külleme:

- 1.uygulama:** Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
 - 2.uygulama:** Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
 - 3.uygulama:** Çiçek taç yapraklarının döktüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
 - 4.ve diğer uygulama:** Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine karar yapılır.
- Bağ mildiyö:** İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ kurşuni küf:

- 1.uygulama:** Tanelerin olgunluk başlangıcında yapılmalıdır.
- 2. ve diğer uygulamalar:** Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile hastalığında seyrine göre devam edilir.

Bağ Ölükol:

*Yaz uygulaması

- 1.uygulama** sürgünler 2-3 cm olduğunda,
 - 2.uygulama** sürgünler 8-10 cm olduğunda,
 - 3.uygulama** sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
- Patlıcangillerde külleme (Domates):** Uygulamalar tarlada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
- Kabakgillerde külleme (Hıyar):** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üzerinde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.
- Kabakgillerde mildiyö (Hıyar):** Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Aralık 2017

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest®
GRUP
Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

Agrocrip®

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	M:M4	G1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	------	-------------------------

% 70 Folpet + % 1,5 Triadimenol

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma küllemesi:

1. uygulama; Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2. uygulama; Çiçek taç yapraklarının % 60-70'i döküldüğünde,

3. ve diğer uygulamalar; Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Şeftali yaprak kıvrıkcılığı: Uygulama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır. Tomurcukların iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Agrocrip adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M:M4 ve G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Agrocrip'in** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M:M4 ve G1:3**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Agrocrip yağlar ve dinitro bileşikleri, yaprak gübreleri özellikle organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile geniş çaplı bir karışım yapılmadan önce fiziksel karışım bakımından uygun test yapılmalı ve kullanılacak bitkiye karşı güvenliği için de ufak parselde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Aralık 2017

M. N.

Dr. Yunus BAĞRAM
Genel Müdür Yardımcısı V



RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA
Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest®
GRUP
Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410