

Best Amin® 500 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu O 4 HERBİSİT (Yabancıot ilacı)

500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 14 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bitki koruma ürünü ağızdan alındığında kusma, ishal, reflexlerde azalma, vücut faaliyetinde düzensizlik görülür. Nabız hızla atar, bazı vakalarda ölüm görülebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde karaciğer ve böbreklerde hasar görülmüştür. Temas ettiği deride arazlar görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Burun ve ağzı su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Ağzı suyla iyice çalkalayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş glyisileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Bitki koruma ürününün sindirim yolu ile alındığından şüpheleniliyor ise mide tuzlu su alınmasını müteakip ılık su ile yıkanarak boşaltılmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Sarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 02.12.2004/4904

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
HUBUBAT	Kanavcı otu (<i>Adonis spp.</i>)	160 ml/da Kardeşlenme dönemi başlangıcında,
	Kandamlası (<i>Adonis flammea</i>)	
	Karamuk (<i>Agrostemma githago</i>)	
	Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>)	
	Siğirdili (<i>Anchusa leptopylla</i>)	
	Papatya (<i>Anthemis spp.</i>)	
	Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>)	
	Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>)	
	Sürünücü çan çiçeği (<i>Campanula rapunculoides</i>)	
	Küçük pıtrak (<i>Caucalis platycarpus</i>)	
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	200 ml/da Kardeşlenme dönemi sonunda.
	Güneş dikenini (<i>Centaurea salsitialis</i>)	
	Pelemir (<i>Cephalaria syriaca</i>)	
	Farekulaklı boynuz otu (<i>Cerastium perfoliatum</i>)	
	Sarı mum çiçeği (<i>Cerinth minor</i>)	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Ak hindiba (<i>Chondrilla juncea</i>)	
	Yabani hindiba (<i>Cichorium intybus</i>)	
	Hazeran (<i>Consolida anthoroidea</i>)	
	Yabani karanfil (<i>Dianthus anaticus</i>)	
Avrupa dönbabası (<i>Erodium hoefftianum</i>)	(Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir)	
Sütleğen (<i>Euphorbia microsphaera</i>)		
Tarla atkuyruğu (<i>Equisetum arvense</i>)		
Anadolu şahteresi (<i>Fumaria kralikii</i>)		
Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)		
Adi şahtere (<i>Fumaria vaillantii</i>)		
Turnagagası (<i>Geranium spp.</i>)		
Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>)		
Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>)		
Mürdümük (<i>Lathyrus spp.</i>)		
Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>)		
Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)		
Yabani mürdümük (<i>Lathyrus aphaca</i>)		
Yabani ebegümeçi (<i>Malva sylvestris</i>)		

Net miktarı: (kg veya l)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: 2,4 D tuzları

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında bitki koruma ürünü fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürünü tahlil dışında kültür bitkilerine zararlı olduğundan karışım veya buharının civar bitkilere fitotoksik etki yapmaması için çok dikkatli olunmalıdır.
- Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağması halinde uygulama tekrarlanmalıdır.
- Dondan veya uzun süreli kuraklık tan sonra, çiğ olduğu veya yağış beklenen kapalı havalarda, bulutlu günlerde uygulama yapmayınız.
- Şeker hastalarını uygulama işinde çalıştırmayınız.

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İht. Alat. İnciraltı S. 37. 41 v. İzmit
Anonim Şirketi Y.N. Çukuroba 1410

06 Mayıs 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



HUBUBAT	Taş yoncası (<i>Melilotus indica</i>) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Çobanedeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Muhabbet çiçeği (<i>Reseda lutea</i>) Kanarya otu (<i>Senecio vernalis</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Yemlik (<i>Tragopogon bupthalmoides</i>) Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>) Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>) Yavşan otu (<i>Veronica persica</i>) Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	160 ml/da Kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml/da Kardeşlenme dönemi sonunda. 300 ml/da Karadeniz bölgesinde geç dönemde kullanılır. (Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir)
MISIR	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Boz ot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası Mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Best Amin® 500 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	O 4	HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
-------	-----	----------------------------

500 g/l 2,4-asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMAÇI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İnşaat İthalat İhracat Sın. ve Ticaret
Anonim Şirketi N.Ü. Güo.İst. 1410

6 Mayıs 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalar 3 atm basınç ve yelpaze huzmeli memeler kullanılarak yapılmalıdır. Çok rüzgârlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 °C'den düşük olması halinde uygulama yapmayınız. Rüzgâr hızı 16 km/h 'ten fazla olduğunda uygulamaya ara verilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Best Amin 500 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup O 4** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Best Amin 500 SL 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup O 4** harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

Best Amin®500 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	O 4	HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
-------	-----	----------------------------

500 g/l 2,4-asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FIRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

6 Mayıs 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Ahmet ELMACI
Teknik Müdür
agrobest®

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Y.N. Guş uđı 1410