

## Bio-Cure F®

Solüsyon Konsantre (SL)

Grubu	BIYOLOJİK FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	-----------------------------------

*Trichoderma viride* 1x10<sup>8</sup> kob/ml min.

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Yutulursa ve/veya solunursa mide bulantısı, mide rahatsızlıkları görülebilir. Cilt ve göz ile temas durumunda hafif tahriş görülebilir. Allerjik reaksiyon yapabilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde,** özel tavsiye için doktora danışın  
**Yutulması halinde,** hemen tıbbi yardım alın.  
**Cilt ile teması halinde,** cildi sabun ve su ile iyice yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.  
**Göz ile teması halinde,** hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tıbbi yardım alın. Bu güvenlik bilgi formunu sağlık personeline gösterin.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel 114

Net miktarı: (kg veya L)  
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: *Trichoderma viride*, Besin ortamı + seyreltici

Zararlılık işaretleri  
Sınıflandırılmamıştır  
Uyarı Kelimesi: -

### Zararlılık ifadeleri (H)

- H315** Cilt tahrişine yol açar.  
**H319** Ciddi göz hasarına yol açar.

### Önlem ifadeleri (P)

- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
**EUH01** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. BKÜ ve ambalajını yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 12 ay süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

Ahmet ELMACI  
Teknik Müdür

agrobest  
GRUP

Agrobest Grup Tarım İhtiyaçları Tedarikçisi  
İmalat, İthalat, İhracat, Servis, İcralet  
Anonim Şirketi / K. 000 000 1410

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 10.10.2018 / 11228

### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu
HIYAR (sera)	Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Phythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> )	300 ml/da (damlama)

Bio Cure F damla sulama yöntemiyle fidelere uygulanır.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

### Kalibrasyon:

Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10 u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

### Uygulama Ekipmanının Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

#### Ürünün Özellikleri

*Trichoderma viride* toprak kökenli bir organizma olup, toprak kaynaklı hastalıklara karşı iyi bir etki göstermektedir. Hedef patojenlere karşı yüksek düzeyde besin rekabeti sağlayarak asıl etkisini sağlar. Patojenlere karşı gösterdiği hiperparazitik etki de diğer yönden tamamlayıcı bir diğer etki mekanizmasıdır.

Uygulama damlama sulama sistemi ile yapılır. Uygulamadan önce damlama sulama sistemi 15 dakika açık bırakılır, daha sonra uygulamaya geçilir ve uygulama yarım saat içinde bitirilir. Uygulama esnasında toprağın tavda olmasına dikkat edilir. İlacın kök sistemine ulaşması için uygulamadan sonra damlama sulama sistemi 15 dakika daha çalıştırılır. Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH'sı 6,5 - 8 arasında olmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM

Genel Müdür Yardımcısı



10 Ekim 2018

## Bio-Cure F®

Solüsyon Konsantre (SL)

Grubu	BİYOLOJİK FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	-----------------------------------

*Trichoderma viride* 1x10<sup>8</sup> kob/ml min.

### Hıyar (sera) Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü:

Solgunluk ve kök çürüklüğü hastalıklarına karşı mücadele toprak boşken dezenfeksiyon amacı ile yapılır. **1. Uygulama** dikimden 1 hafta önce dikim için hazırlanmış sıralara, **2. uygulama** fide dikiminin hemen sonrasında, **3. Uygulama** 2. Uygulamadan 15 gün sonra, gerek görüldüğü takdirde 15 gün aralıklar ile uygulamaya devam edilir.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Bio-Cure F'in kimyasal bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bio-Cure F uygulaması ile kimyasal bitki koruma ürünü uygulaması arasında 15 gün beklenmesi tavsiye edilir.

### ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM YERİ

T.Stanes And Company Limited  
8/23-24 Race Course Road, Coimbatore 641 018 –Tamil Nadu/ Hindistan  
Tel: 91-422-2221514,2223515, Fax: 91-422-217857,217432

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI  
Teknik Müdür

Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.  
10 Ekim 2018



agrobest  
Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.  
İnönü İht. ve Tic. Yat. S. ve T. Tic. Sic. No: 1410  
Ankara Şişli V.N. Cad. No: 1410