

Cedriks®

Sıvı formülasyon (SL)

Grubu BİYOLOJİK FUNGİSİT (Mantar ilacı)

Pseudomonas fluorescens strain Pf1 % 1,5,
1x10⁸ kob/ml min.

- Önce Etiket Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İçine Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Yutulursa ve/veya solunursa mide bulantısı, mide rahatsızlıkları görülebilir. Cilt ve göz ile temas durumunda hafif tahriş görülebilir. Allerjik reaksiyon yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel ilk yardım uygulayın, dinlendirin, sıcak tutun ve temiz hava sağlayın.
Yutulması halinde: Hasta kendindeyse bir miktar suyu yudum yudum içirin. Kusturmayın. Hasta kendinde değilse ağızdan bir şey vermeyin.
Solunması halinde: Açık havaya çıkın. Gerekirse yapay solunum yapın.
Cilt ile teması halinde: Derhal BKÜ ile bulaşık giysileri çıkarın ve cildi 15-20 dakika bol sabun ve su ile yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun.
Göz ile teması halinde: Kontakt lens varsa çıkartın ve göz kapaklarını iyice açarak en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Doktora gösterin.
İlk yardım önlemleri "Önlem ifadeleri (P)" bölümünde verilmiştir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 26.04.2013/9184

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	300 ml / 100 L su
Hıyar (sera)	Kabakgillerde kök çürüklüğü (<i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	300 ml / da
Çilek (tarla/sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	300 ml / 100 L su
Patates	Patates Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Siğil hastalığı (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500 ml / 100 Kg. Tohum
Kayısı	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	300 ml/100 L su
Kültür Mantarı	Örümcek Ağı Hastalığı (<i>Dactylium dendroides</i>)	5 ml/ m ²

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10' u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız.

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Steril RO su içinde özel fungal ortamı (SFM), *Pseudomonas fluorescens*

Zararlılık ifadeleri (H)

Sınıflandırılmamıştır.

Uyarı Kelimesi: -

Önlem ifadeleri (P)

P280	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501	İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401	İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürün ve ambalajını yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Cedriks®

Sıvı formülasyon (SL)

Grubu BİYOLOJİK FUNGİSİT (Mantar ilacı)

Pseudomonas fluorescens strain Pf1 % 1,5,
1x10⁸ kob/ml min.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KEŞİNLİKLE YASAKTIR**

Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Damlama sulama için: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Pseudomonas fluorescens toprakta ve yaprak filosferinde bulunan alttaş (enzim yoluyla eylem gösteren molekül) yarışma yoluyla patojen kontrolü sağlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Cedriks uygulamasına bağ'da ilk hastalık belirtileri görülmesi ile başlayınız ve şartlar değişmedikçe 7-10 gün ara ile kullanmaya devam ediniz.

Bağ (Kurşuni küf):

1.Uygulama tanelerin olgunlaşma başlangıcında;
2.ve diğer uygulamalar; bitki koruma ürününün etki süresi (10 gün) dikkate alınarak uygulamalar yapılır.

Kabakgillerde kök çürüklüğü (Hıyar-sera) : Hıyar'da toprak kökenli patojenlere karşı Cedriks ilacı ile ilk uygulama fide dikiminden bir hafta önce damlama sulama ile yapılır. İkinci uygulama fide dikiminin hemen sonrasında, diğer uygulamalar da fide dikiminden sonra 15'er gün aralıklarla yine damlama sulama ile yapılır.

Çilek kurşuni küf: 1. Uygulama ilk çiçeklerin %10'u açınca, 2. Uygulama çiçeklerin % 50'si açınca, 3. Uygulama ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Uygulama bitkilerin gövde, yaprak ve dallarında kuru bir yer kalmayacak şekilde eşit olarak pülverize yapılmalıdır. Sıcak saatlerde, rüzgârlı havalarda, bitkilerin yaprakları çok kuru ve solgun olduğunda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH'sı 4,5 – 8,5 arasında olmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM YERİ

T.Stanes And Company Limited

8/23-24 Race Course Road, Coimbatore 641 018 – Hindistan

Tel: 91-422-2221514,2223515, Fax: 91-422-217857,217432

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobrestgrup.com

13 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



agrobrest®
GRUP

Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

Cedriks®

Sıvı formülasyon (SL)

Grubu BİYOLOJİK FUNGİSİT (Mantar ilacı)

Pseudomonas fluorescens strain Pf1 % 1,5,
1x10⁸ kob/ml min.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KEŞİNLİKLE YASAKTIR**

Patates Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Siğil hastalığı: 100 kg'lık patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen miktardaki ilaç 900-1000 ml. su ile karıştırılır. Püskürtme yönteminde, uygun dozda hazırlanan ilaçlı karışım sırt pulverizatörü ile temiz bir örtü veya sert bir zemin üzerine serilen tohumluklara püskürtülür. Yumruların her tarafının homojen bir şekilde ilaçla kaplanması için karıştırılması gerekmektedir.

Kayısı Çiçek Monilyası:

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
1. Uygulama: Tam Çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Kültür Mantarı Örümcek Ağı Hastalığı: Örtü toprağının serilmesinden hemen sonra koruyucu olarak veya ilk mantar taslakları görülür görülmez veya hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez yapılmalıdır. İlaçlama yüzey ilaçlaması şeklinde olup, önerilen bitki koruma ürünleri örtü toprağının nem durumuna göre m2'ye 1 veya 2 litre ilaçlı su gelecek şekilde püskürtülür. Özellikle hastalık çıktıktan sonra yapılacak ilaçlamalarda ilaçlama ile hasat arasındaki süreye kesinlikle uyulmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Cedriks fungusitler ile uyumludur. Herbisit ve insektisitlerle karıştırmayın.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM YERİ

T.Stanes And Company Limited
8/23-24 Race Course Road, Coimbatore 641 018 – Hindistan
Tel: 91-422-2221514,2223515, Fax: 91-422-217857,217432

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

agrobest®
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410