

Changer®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

| | | |
|-------|------|-------------------------|
| Grubu | C2:7 | FUNGİSİT (Mantar ilacı) |
|-------|------|-------------------------|

% 50 Boscalid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı halsizlik. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

Cilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin bas göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Boscalid, Kaolen

Zararlılık işaretleri



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

Zararlılık ifadeleri (H)

| | |
|------|--|
| H302 | Yutulması halinde zararlıdır. |
| H318 | Ciddi göz hasarına yol açar. |
| H411 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. |

Önlem ifadeleri (P)

| | |
|--------------------|--|
| P273 | Çevreye verilmesinden kaçının. |
| P280 | Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. |
| P305 + P351 + P338 | GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |
| P313 | Tıbbi tavsiye alın/ doktorunuza başvurun. |
| P501 | İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. |
| EUH401 | İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz |

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılarla zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

Ahmet ELMACI
Ticari Müdür
agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumluk
İmalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 14.02.2013/9089

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı organizma adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| BAĞ* | Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 120 g/100 L su | 14 gün |

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda kurşuni küf:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde

1. ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında

2. ilaçlama: Kullanılan bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege, Marmara, Doğu Anadolu Bölgelerinde

1. ilaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce

2. ilaçlama: Kapalı salkım döneminde

3. ilaçlama: Kullanılan bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR
15 Ocak 2018

Changer®

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

| | | |
|-------|-------|-------------------------|
| Grubu | C2, 7 | FUNGİSİT (Mantar ilacı) |
|-------|-------|-------------------------|

% 50 Boscalid

Etki şekli ve özellikleri: Önleyici ve koruyucu etkili sistemik bir fungusittir. Kurşuni küf hastalığı etmeninin tüm yaşam çevrimini etkileyerek kontrol sağlar. Uygulamadan kısa bir süre sonra yapraklardan alınarak bitkinin diğer kısımlarına taşınır ve uzun süre hastalıktan korur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Changer adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Changer'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması önerilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP
Agrobest Grup Tarım İlaçları Teahhütlüğü
İmalat İthalat Alın Sat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Ocak 2018

