

# Cutteng®

Süspo Emülsiyon (SE)

Grubu O,4 B,2 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

452,42 g/l 2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/2'NE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi uyuşukluk. Deride ve gözde tahriş sebep olabilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde;** Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Hemen tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde;** Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağzından bir şey vermeyin. Ağzı suyla iyice çalkalayın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Tıbbi yardım alın.

**Cilt ile teması halinde;** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde;** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Doktor tavsiyesine göre destekleyici tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net miktar: (kg veya l)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: 2,4-D Ethylhexyl ester, Florasulam, Su

Zararlılık işaretleri



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302** Yutulması halinde toksiktir.  
**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
**H318** Ciddi göz hasarına yol açar.  
**H412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.  
**P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
**P305 + P351 + P338** GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
**P310** Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.  
**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  - Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  - Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  - Tavsiye edildiği bitkilere yan etkisi yoktur.
  - Uygulama sonrasındaki sıcak ve nemli şartlar ürünün etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
  - Uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmur ürünün etkisini azaltmaz.
  - Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için uygulamadan önce veya 2 saat sonra yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilir.
  - Toprakta bakiye bırakmaz. Buğday arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsüllere olumsuz bir etkisi yoktur.
  - Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  - Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- DİKKAT:** Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
 Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)  
 Şarj numarası : (damga)  
 Ruhsatname tarihi ve numarası: 07.04.2014/9597

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
BUĞDAY ARPA	Kandamlası ( <i>Adonis aestivalis</i> ) İtalyan sığırdili ( <i>Anchusa azurea</i> ) Yatık boya kökü ( <i>Asperugo procumbens</i> ) Taşkesen otu ( <i>Buglossoides arvensis</i> ) Sarı ot ( <i>Boreava orientalis</i> ) Rum yalancı keteni ( <i>Camelina rumelica</i> ) Yabani tere ( <i>Cardaria draba</i> ) Boynuz otu ( <i>Cerastium dichotomum</i> ) Uzun süpürge otu ( <i>Descurainia sophia</i> ) Kıraç ıtırı ( <i>Geranium stepporum</i> ) Sarkık meyveli yavruağzı ( <i>Hypocoum pendulum</i> ) Yabani çivit otu ( <i>Isatis tinctoria</i> ) Trakya hardalı ( <i>Neslia apiculata</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Süpürge otu ( <i>Sisymbrium altissimum</i> ) Kaba fiğ ( <i>Vicia narbonensis</i> ) Adi fiğ ( <i>Vicia sativa</i> )	50 ml/da	14 gün
	Tarla Papatyası ( <i>Anthemis fumariifolia</i> ) Saka dikenini ( <i>Carduus pycnocephalus</i> ) Tarla hazerani ( <i>Consolida regalis</i> ) Boynuzlu yoğurt otu ( <i>Galium tricorntutum</i> ) Süpürge otu ( <i>Polygonum bellardii</i> ) Tarla düğün çiçeği ( <i>Ranunculus arvensis</i> ) Meryem dikenini ( <i>Silybum marianum</i> ) Parmaklı yavşan otu ( <i>Veronica triphyllos</i> )	60 ml/da	14 gün
	Kekre ( <i>Acroptilon repens</i> ) Kokar ot ( <i>Bifora radians</i> ) Gökbaş ( <i>Centaurea cyanus</i> ) Köygöçüren ( <i>Cirsium arvense</i> ) Doğu ballıbabası ( <i>Wiedemanian orientalis</i> )	70 ml/da	14 gün

11 Haziran 2019

Rev.002-1217

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 KABUL EDİLMİŞTİR.

DS N

Ahmet ZEMACI  
 Teknik Müdür

agrobest  
 Agrobest Grup Tarım İlaçları Telematik  
 İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
 Anonim Şirketi Y.N. 008 031 1410

## Cutteng®

Süspo Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----	-----------------------------

452,42 g/l 2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam

*MISIR	İmam pamuğu ( <i>Abutilon theophrasti</i> ) Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Uzun loğusa otu ( <i>Aristolochia maurorum</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Yatık sirken ( <i>Chenopodium vulvaria</i> ) Dilkanatan ( <i>Galium aparine</i> ) Gökbaş ( <i>Centaurea depressa</i> ) Gecesefası ( <i>Ipomea stolonifera</i> ) Adi soda otu ( <i>Salsola kali</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	70 ml/da	14 gün
	Kekre ( <i>Acroptilon repens</i> ) Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	80 ml/da	14 gün

\* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.  
**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Cutteng uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI  
Teknik Müdür

agrobest  
AGROBEST

Agrobest Grup Tarım İlaçları Temin ve Kontrol  
İnönü Üstü Köyü İbrahim Paşa Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi V.N. 008 001 1410

11 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



## Cutteng®

Süspo Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----	-----------------------------

452,42 g/l 2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam

**Hububat (Buğday-Arpa):** Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki anlamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

**Mısır:** Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15°C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

### DİRENÇ YÖNETİMİ:

**Cutteng** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup O,4 +B,2** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Cutteng** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup O,4 +B,2** harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı ot herbisitlerinden Fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı herbisitler ile karıştırılması tavsiye edilmez. Alban 4 EC ve Chlorpyrifos-methyl terkipli insektisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Azot, Fosfor ve Potas terkipli yaprak gübrelere ile karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

### RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FIRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI  
Teknik Müdür

agrobest  
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumluk  
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi K.N. 066 001 1419

11 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



34 N