

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 17.01.2014/9461

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
BUĞDAY	Sarı pas (<i>Puccinia striiformis</i>) Septoria yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	100 ml/da	35 gün

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu karışım yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Filkana buğdayda sorun olan Pas ve Septoria yaprak lekesi hastalıklarına karşı etkili koruyucu ve tedavi edici özellikte bir fungisitir.

Buğday sarı pası:

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde uygulamalara devam edilir.

agrobest®

Filkana®

süspansiyon konsantre (SC)

Grubu: G1:3 FUNGİSİT (Mantar İlaç)

100 g/l Fluquinconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Ede kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMAMIŞI

KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün bos ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulamaya tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Alerjik etki yapabilir. Adale konsantrasyon bozukluğu, karında şiddetli sancılar, terleme, bulantı, kusma ve baş ağrısı yapabilir. Diğer zararlı belirtileri "Zararlılık İfadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

ILK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluması halinde; Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Solumam yollarının açık kalmasını sağlayın. Tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Cilt ile temas halinde; Kazazedeyi kirletme kaynağından uzaklaştırın. Kirletmiş giysileri çıkarın ve eldi su ile iyice yıkayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika boyunca suyla yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra olursursa derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı: (kg veya l)
Azamı perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Fluquinconazole

Zararlılık İşaretleri



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

Zararlılık İfadeleri (H)

- H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H334 Soluması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
- H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
- H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri (P)

- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+ GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takıl ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
- P342+P311 Solumam bulguları gösterirse: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

Ahmet Elmacı
Teknik Müdür

agrobest®

Agrobest® Gübre ve Tarım İlaçları Teknolojileri
Ulusal İlaç ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.K. Üste 1410

Filikana®

Süspanسیون Konsantre (SC)

Grubu **G1:3** FUNGISİT (Mantar ilacı)

100 g/l Fluquinconazole

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun geliyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kin döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaksıza ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Filikana adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Filikana'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G1:3** hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞILIBILIRLIK DURUMU:

Filikana Deltamethrin içeren insektisitlerle ve yaprak gübrelereyle karıştırılması halinde, her ihtimale karşı ön karışım testi yapılması gerekir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bosjalen ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Bosjalen gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bujaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
- Karışımın tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Son uygulama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüt (tolerans) sınırları dışında bir deęişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

Agrobest®
FARMASİYON
Agrobest Grup Tarım İlaçları Tedarikçisi
İstanbul İhtisatlı İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.K. Üüs. Üstü 1410

GIDA TARIMI ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.