

Fullrow®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

150 g/l. Fluzifop-P-butyl

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Zehirlenme belirtileri ilaca özel değildir. Mide bulantısı, kusmayla birlikte baş dönmesi ve baş ağrısı görülür. Bu belirtilere ilave olarak ishal de görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin.

Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın. Ağız suyla iyice çalkalayın.

Cilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Ağrı yok olana kadar bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 24.02.2014/9513

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
PAMUK	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.	56 gün
SOĞAN	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	50 ml /da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde	28 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kaynaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde	
BAĞ*	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken.	28 gün
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cyndon dactylon</i>)	150 ml/da Köpek dişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken	
MERCİMEK	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken	56 gün

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fluzifop-p-butyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H411 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P271** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P308+ Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P313 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Ahmet EL MACI
Teknik Uzman

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarımı Başları Teknolojik
Konya 45100 İbrahimpaşa 5. Kat
Konya Merkez 0312 222 1111

16 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



ŞEKER PANCARI	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken.	56 gün
	Kısır yabaniyulaf (<i>Avena sterilis</i>)	50 ml/da Yabani yulaf kardeşlenme döneminde iken	
DOMATES	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75 ml/da darıcanlar 10-12 cm boyda iken	28 gün
PATATES	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-20 cm, darıcanlar 8-10 cm boyda iken	28 gün
KANOLA	Kendi gelen Buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	50 ml/da Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda	28 gün
	İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)	100 ml/da İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Fullrow®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

150 g/l. Fluzifop-P-butyl

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumluk
İmalat İthalat İhracat Şişli ve Ticaret
Anonim Şirketi Nispetiye/İstanbul 34110

16 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Genel Müdür Yardımcısı V.

Fullrow®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

150 g/l.Fluazifop-P-butyl

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Fullrow, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Graminae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıktiktan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili selektif bir bitki koruma ürünüdür. Fullrow uygulama ile hasat arası süreye uymak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin her döneminde kullanılabilir. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önceden kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Uygulamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için uygulama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. Uygulama için yelpaze hüzmeli memeler en uygun olanıdır. Bitki koruma ürünü uygulamadan bir saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Fullrow adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Fullrow'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 1 hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

16 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
N



Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Şirketi Ticaret
Anonim Şirketi K.N. Güneşli 1410