

İmal Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj numarası:  
Ruhsatname tarihi ve numarası: 25.10.2004/4860

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Yabancı ot adı	Uygulama Dozu
AYÇİÇEĞİ	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası
	Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )	
	Köpekdişi ayrığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )	
	Püsküllü çayır ( <i>Bromus tectorum</i> )	
	Tavşanbıayı=Salkım otu ( <i>Poa annua</i> )	
	Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	
	Yabani arpa ( <i>Hordeum spontaneum</i> )	
BAĞ*	Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )	100 ml/da Köpek dişi 15-20 cm Kanyaş 2-3 kardeşte iken
	Köpekdişi ayrığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )	
DOMATES	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	100 ml/da Domates 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası
	Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )	
KANOLA	Köpekdişi ayrığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )	
	Delice ( <i>Lolium temulentum</i> )	200 ml/da çıkış sonrası  100 ml/da çıkış sonrası
	Kendi gelen buğday ( <i>Triticum aestivum</i> )	
	Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )	
	Köpekdişi ayrığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )	
	Kuş yemi ( <i>Phalaris spp</i> )	
	Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	
KIRMIZI MERCİMEK	Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> )	
	Ayrık ( <i>Elymus repens</i> )	100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
	Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )	
	Kendi gelen arpa ( <i>Hordeum vulgare</i> )	75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
	Kendi gelen buğday ( <i>Triticum aestivum</i> )	
	Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	

# Helga Süper®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

- Önce Etiketi Okuyunuz.
- Evde Kullanmayıniz.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayıniz.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayıniz.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Bosaltıniz. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114**

Net miktar:

Azami perakende satış fiyatı:

**İçindekiler:** Quizalofop-p-ethyl, Ksilén

**Zararlılık işaretleri**




**Uyarı Kelimesi: TEHLIKE**

**Zararlılık ifadeleri (H)**

- |        |  |
|--------|--|
| H226   | Alevlenir sıvı ve buhar.                             |
| H312 + | Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır. |
| H332   |  |
| H315   | Cilt tahrîşine yol açar.                             |
| H318   | Ciddi göz hasarına yol açar.                         |

**Önlem ifadeleri (P)**

- |        |  |
|--------|--|
| P261   | Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.   |
| P264   | Elleylemeden sonra kirletmiş cildi iyice yıkayın.  |
| P271   | Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.   |
| P280   | Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.   |
| P302+  | DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.   |
| P352   |  |
| P304+  | SOLUNDÜĞÜNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.                          |
| P340   |  |
| P305+  | GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |
| P351+  |  |
| P338   |  |
| P362 + | Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.   |
| P364   |  |
| P501   | İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  |
| EUH401 | İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz  |



GIDA TARIM VE HAYVANLIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Rev.002-0317

J. n. 05 Nisan 2017

*X. Hanul*  
**agrobest®**  
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Ticaret Ltd. Şti.  
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi Ufak, 06821 11410

NOHUT	Kendi gelen buğday ( <i>Triticum aestivum</i> )	75 ml/da çıkış sonrası	<b>Helga Süper®</b> Emülsiyon Konsantre (EC) <table border="1"> <tr> <td>Grubu</td><td>A 1</td><td>HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)</td></tr> </table> <p>50 g/L Quizalofop-p-ethyl</p>	Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)	<b>KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDILECEK HUSUSLAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.</li> <li>- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.</li> <li>- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.</li> <li>- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.</li> <li>- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.</li> <li>- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.</li> </ul>
Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)					
Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )							
Yabani yulaf ( <i>Avena fatua</i> )							
PAMUK	Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )	75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.					
SOĞAN	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	<b>100 ml /da</b> Soğan 15-20 cm boyunda iken, kanyaşların 3-5 yapraklı, dárcan ve yapışkan dárların 10- 15 cm boyunda oldukları dönemde	<b>İLK YARDIM ÖNLEMLERİ</b> <b>Solunması halinde;</b> Bakınız önlem ifadeleri P304+ P340, <b>Yutulması halinde;</b> Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. <b>Kusturmaya çalışmayıñ.</b> Ağız suyla iyice çalkalayın. <b>Cilt ile teması halinde;</b> Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. <b>Tıbbi yardım alın.</b> <b>Göz ile teması halinde;</b> Bakınız önlem ifadeleri P305+ P351+ P338,	<b>DEPOLAMA DURUMU</b> Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.			
	Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )						
	Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> )						
SOYA FASULYESİ	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	<b>100 ml/da</b> Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası	<b>ANTİDOTU VE TEDAVİSİ</b> Bilinen bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.	<b>FİRMA BEYANI</b> Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.			
	Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )						
	Köpekdişi ayrıgi ( <i>Cynodon dactylon</i> )						
	Kuş yemi=Yumuşak başaklı kuşyemi ( <i>Phalaris paradoxa</i> )						
	Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )						
ŞEKER PANÇARI	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	<b>75-100 ml/da</b> Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.		<b>RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA</b> Agrobest Grup Tar.İİ.Toh.İml.İth.San.Tic.A.Ş. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR <b>Tel:</b> 0232 877 17 70, <b>Fax:</b> 0232 877 17 71 <a href="http://www.agrobestgrup.com">www.agrobestgrup.com</a>			
	Püsküllü çayır ( <i>Bromus tectorum</i> )						
	Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )						
	Yabani yulaf ( <i>Avena fatua</i> )						

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

##### Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için aletin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.



GIDA TARIM VE HAYVANÇLIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR  
05 Nisan 2011

Rev.002-0317

J. N.

Agrobest Grup Tarım İlaçları Ticaret  
İnzat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

**Uygulamaya Hazırlama:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini karıştırarak tüm parçalarının yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**

Bitki Koruma Ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanya için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir) yabancı otların üzerine püskürtmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

Helga Super adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Helga Super'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıınız. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup A 1 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABILİRLİK DURUMU**

Alkali bitki koruma ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

# Helga Süper®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

**RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA**

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.Ith.Ihr.San.Tic.A.Ş.  
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

**Tel:** 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71

[www.agrobestgrup.com](http://www.agrobestgrup.com)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Rev.002-0317

05 Nisan 2017



**agrobest®**  
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tıhmuculuk  
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

Sayfa 3 / 3