

Korte®50 WP

Islanabilir Toz (WP)

| | | |
|-------|----|-----------------------------|
| Grubu | K1 | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) |
|-------|----|-----------------------------|

% 50 Propizamide

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Cilt ve gözde yanma ve tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın.

Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114



İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 05.09.2016/10749

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

| Bitki Adı | Kontrol Ettiği Yabancı Otlar | Kullanım Dozu |
|---------------|---|--|
| YONCA | Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i>) (<i>Cuscuta approximate</i>) | 300 g/da Yoncalar biçildikten sonra |
| ŞEKER PANCARI | Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i>) (<i>Cuscuta approximate</i>) | 300 - 400 g/da Küskütler çimlendikten sonra pancara sarılmadan önce şekerpancari 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken. |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Korte 50 WP islanabilir toz formülasyonda bir bitki koruma ürünüdür. Korte 50 WP'den en iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda dekara 60-80 litre su kullanılarak atılmalıdır.

Yoncada küsküt mücadelesinde Korte 50 WP, iki ayrı zamanda uygulanabilir.

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Propizamide, Kaolen

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302+** Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H332
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H410 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261** Tozunu solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P308+ Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P313 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P501 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
EUH401

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir. Kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunuz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılması tavsiye edilmez.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste uygulama yapmaktan kaçınınız.

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobast Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat S. r. a. ş. v. Ticaret
Anonim Şirketi B.İ.Ç. C. No: 1410

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

15 Ocak 2019

Korte® 50 WP

Islanabilir Toz (WP)

| | | |
|-------|----|-----------------------------|
| Grubu | K1 | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) |
|-------|----|-----------------------------|

% 50 Propizamide

1) Geç kış uygulaması: Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz püskürtülen bitki koruma ürününün toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapılan uygulamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür.

2) İlk hasattan hemen sonra: Ot hasadından hemen sonra yapılacak uygulama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur.

Geç kış uygulamasında dekara 20 litre su, hasattan hemen sonra ise dekara en az 40 litre su ile atılması tavsiye edilir.

Bitki koruma ürününün uygulamasını takip eden süreçte eğer yağmur yağışı yoksa ve/veya kurak geçen bir sezonun ardından kullanılacaksa Korte 50 WP'den daha iyi bir etki almak için, bitki koruma ürününün kurumasının ardından toprağı hafif bir şekilde (5-10 mm) yağmurlama sulama ile ıslatınız.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ: Şeker pancarını takiben Korte 50 WP uygulanmış alana münavebe bitkisi olarak kışlık tahıllar ekilecek ise, toprağın en az 15 cm. derinlikte sürülmesine dikkat ediniz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Korte 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Korte 50 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com

ÇİÇEK VE ORMAN BAKANLIĞI
TİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
15 Ocak 2019



Ahmet ELMACI
Teknik Müdür
agrobest
GRUP
Agrobest Grup ÇiçEK İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat S. Tic. ve İ. Ticaret
Anonim Şirketi B.İ.K. C. No: 61 1410