

Orisafem® 600

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	F ₃ 13	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-------------------	-----------------------------

600 g/l Aclonifen

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ½'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Hemen tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde; Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Tıbbi yardım alın.
Cilt ile teması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın.
Göz ile teması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanır ve belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Aclonifen

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208 Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P220 Kıyafetlerden uzak tutun.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P401 Ulusal yönetmeliklere göre depolayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Nohut'un ve mercimeğin çiçeklenme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest®
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tehniklik
İmalat İthalat İhracat Servisi ve Ticaret
Anonim Şirketi K.İ. Bulvarı 1410

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 07.04.2014/9602

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
AYÇİÇEĞİ (Çıkış öncesi)	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken-İştir (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Ballıbababa (<i>Lamium amplexicaule</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Serçedilli (<i>Stellaria media</i>) Yavşanotu (<i>Veronica hederifolia</i>)	Geniş yapraklı yabancı otlarda: 200 ml/da Darıcan otuna: 300 ml/da Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	--
AYÇİÇEĞİ (Çıkış sonrası)	Sirken-İştir (<i>Chenopodium album</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yapraklı döneminde	45-50 gün
HAVUÇ	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken-İştir (<i>Chenopodium album</i>) Yabancı semizotu (<i>Portulaca oleraceae</i>) Yeşil kirpidarı (<i>Setaria viridis</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	150 ml/da Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	--

16 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Orisafem® 600

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	F ₃ 13	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-------------------	-----------------------------

600 g/l Aclonifen

NOHUT	Sirken-Iştir (<i>Chenopodium album</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Küçük turp (<i>Rapistrum rugrosum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	45-50 gün
	Dikenli yabancı marul (<i>Lactuca serriola</i>)	75 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	
MERCİMEK (Çıkış öncesi)	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	250 ml/da 300 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	--
MERCİMEK (Çıkış sonrası)	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	45-50 gün
	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobrestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat S.İ. Tic. ve İ. Ticaret
Anonim Şirketi N. No: 660 001 1410

16 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Orisafem® 600

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	F ₃ 13	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-------------------	-----------------------------

600 g/l Aclonifen

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çıkış öncesi uygulamalarda toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Bunun için toprak iyi işlenmiş, keseksiz olmalı ve dekara 20-50 litre su kullanılmalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda kültür bitkisinde kısa süreli ve geçici hafif sararma görülebilir. Uygulamalar mercimeğin çiçeklenme başlangıcından önce bitirilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Orisafem adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F₃ 13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Orisafem 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F₃ 13 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FIRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Sorumlusu

agrobest®
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Anonim Şirketi
K.Ü. Bulvarı No: 1410

16 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

