

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 17.07.2017/10929

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu
✓ Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)		300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
✓ Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
✓ Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>)		
✓ Yabani dikenli marul (<i>Lactuca serriola</i>)		
✓ Eşek marulu (<i>Sonchus spp.</i>)		
✓ İmam kavunu (<i>Senecio vulgaris</i>)		
✓ Yabani yonca (<i>Medicago spp.</i>)		
✓ Turna gagası (<i>Geranium spp.</i>)		
✓ Sinir otu (<i>Plantago spp.</i>)		
✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)		
✓ Sirken (Kaz ayağı) (<i>Chenopodium album</i>)		
✓ Kırmızı köküllü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
✓ Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
✓ Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)		
✓ Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>)		
✓ Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)		
✓ Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)		
✓ Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)		

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdakayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLÜĞÜ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Delaxtore® 200 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	H,10	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	-----------------------------

200 g/Litre Glufosinate-ammonium

- Önce Etiketini Okuyunuz.
 - Evde Kullanmayınız.
 - Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
 - Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
 - Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
 - İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**
- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının İçine X'üne Kadar Temiz Su Koyarak İçice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Zararlılık belirtileri "Zararlılık İfadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde, Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarıp, rahat nefes alabileceği ve sıcak tutulacağı şekilde dinlendirin. Özel tavsiye için doktora danışın.
Yutulması halinde: Ağzı suyla içice çalkalayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Çiğ teması halinde, Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.
Göz teması halinde, Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını içice açın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:224

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

17 Temmuz 2017



Net miktar: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Glufosinate Ammonium

Zararlılık İşaretleri:



Uyarı Kelimesi: TEHLİKE

Zararlılık İfadeleri (H)

- H302 + H332** Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H360Fd** Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem İfadeleri (P)

- P270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın
- P405** Kilit altında saklayın.
- P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FIRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San.Tic.A.Ş.
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Kadriye İKİZÖNAL
Ruhsatlandırma Müdürü



Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

Handwritten signature and initials.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulamada en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Dekara 20-40 litre suyla, düşük basınçlı aletlerle ve yelpaze huzmeli memeler kullanılarak uygulama yapılır. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna bitki koruma ürünü temas etmemelidir. Bitki koruma ürününün etki şekli sistemik olduğundan, ürünün etkisinin azalmaması için uygulama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işleme yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Delaxtore 200 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup H,10 olarak sınıflandırılan bir Herbisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Delaxtore 200 SL nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup H,10 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Delaxtore® 200 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	H,10	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	-----------------------------

200 g/Litre Glufosinate-ammonium

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San.Tic.A.Ş.
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

17 Temmuz 2017



Kadırye İKİZÖNAL
Ruhsatlandırma Müdürü

agrobest®

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410