

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 20.06.2006/5549

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
TÜTÜN (Fidelik ve tarla döneminde)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>) Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	200 ml/da nimf ve ergin	21 gün
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	200 ml/da larva	
PAMUK	() Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	350 ml/da larva	7 gün

*Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Genel Bilgiler: Sanomyl 20 SL traktörle çekilen pülverizatör ve sırt

Sanomyl® 20 SL

Suda Eriyebilir Sıvı (SL)

Grubu	1 A	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	-----	--------------------------

200 g/l Methomyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KEŞİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan ürünün boş ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak içice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Methomyl zehirlenmeleri antichlorinesterase aktivite ile ilgili halsizlik, baş ağrısı, bulanık görme, bulantı, mide krampı, göğüs sıkışması, gözbebeklerinin büyülmesi, adele titremesi, terleme ve nabız düşmesi gibi etkiler meydana getirir. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

Yutulması halinde; Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Ağzı suyla içice çalkalayın. Tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın.

Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını içice açın. En az 15 dakika yıkayın. Gözlerinizi ovmayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Methomyl

Zararlılık işaretleri



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

Zararlılık ifadeleri (H)

H300 Yutulması halinde öldürücüdür.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önem ifadeleri (P)

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P301+ P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.

P308+ P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobrestgrup.com

Ahmet ELMACI

Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İt. ve İhracat Şirketi
Anonim Şirketi
İzmir - Kemalpaşa / 1410

26 Eylül 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Sanomyl® 20 SL

Suda Eriyebilir Sıvı (SL)

Grubu	1 A	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	-----	--------------------------

200 g/l Methomyl

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Tedavi için ATROPİN SÜLFAT kullanılmalıdır. Damardan 1,2-2 mg dozunda her 10-30 dakikada bir iyileşme görülünceye kadar enjeksiyona devam edilir. Suni teneffüs veya oksijen lüzumlu olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer kolinesteraz inhibitörlerinden hiç biri kullanılmamalıdır. Morfin veya 2-PAM kullanmayın. Bununla beraber Sanomyl 20 SL ve organik fosforlu insektisitlerin zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi ATROPİN SÜLFAT tedavisini tamamlayıcı gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmalıdır. Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

pülverizatörleri ya da kaplama uygulama yapan uygulama aletleri ile kullanılabilir. Ev bahçelerinde kullanmayın. Haşereler ilk görüldüğünde tavsiye edilen dozlarda uygulama yapılır.

Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Sanomyl 20 SL uygulamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken uygulama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Sanomyl 20 SL herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. Sanomyl 20 SL pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan uygulama neticesinde oluşan kızarıklık masülü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri Sanomyl 20 SL'nin Yeşilkurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir. Bir sezonda aynı aynı yerde Sanomyl 20 SL ile 2'den fazla uygulama yapmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Sanomyl 20 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Sanomyl 20 SL 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 A harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Sanomyl 20 SL yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında bitki koruma ürünü ile karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce Sanomyl 20 SL uygulama tankına konulmalıdır.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kuşlara ve yabani hayvanlara zehirlidir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP
Agrobest Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü
İmarat İl Müdürlüğü İhracat Şubesi Ticaret
Anonim Şirketi N. 000 001 1410

26 Eylül 2018
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

