

Seal®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	C ₅	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham		

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ½'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görmeye neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın.
Cilt ile teması halinde; Kirli giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde; Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika boyunca suyla yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. Yıkamaya devam edin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür



Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Phenmedipham, Desmedipham

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302+
H312+ Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H332
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P313 Tıbbi tavsiye alın/ doktorunuza başvurun.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUI401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Karışımın tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyp açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür
agrobest

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İlişkisi İhracat & İthalat İşleri
Ankara Çiftlik Sok. No: 1410

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 18.03.2016/10569

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Şeker pancarı	2 YAPRAKLI DÖNEME KADAR MÜCADELESİ YAPILACAK YABANCI OTLAR Fare kulağı (<i>Anagalis arvensis</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Yabani krizantem (<i>Chrysanthemum segetum</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Unutma benisi (<i>Myosotis arvensis</i>) Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Boğumlu çobandeğneği (<i>Polygonum lapathifolium</i>) Tarla kişnişi (<i>Spergula arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Isırgan Otu (<i>Urtica urens</i>) Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>) Yabani hercai menekşe (<i>Viola arvensis</i>)	400 ml/da Şeker pancarı 2-4 yapraklı dönemde	90 gün
	4 YAPRAKLI DÖNEME KADAR MÜCADELESİ YAPILACAK YABANCI OTLAR Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Adi diş otu (<i>Galeopsis bifida</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Kara pazı (<i>Atriplex patula</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	400 ml/da Şeker pancarı 2-4 yapraklı dönemde	90 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

16 Ocak 2019

Seal®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	C ₁₅	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	-----------------	----------------------------

129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

- o SEAL yabancı otların 2-4 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır.
- o İyi bir kaplama uygulama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir.
- o Uygulamalar yelpaze hüzmeli memeler ile yapılmalıdır.
- o Uygulama sırasında hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde olmamalıdır. Günün serin saatlerinde kullanılmalıdır.
- o Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara bitki koruma ürünü atılmamalıdır.
- o Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Seal adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C₁₅ olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Seal'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C₁₅ harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

16 Ocak 2019



Ahmet ELMACI

Teknik Müdür

agrobest®

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Şirketi Ticaret
Anonim Şirketi No: 000 000 1410