

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZ	İLAÇLAMA ZAMANI
KARANFİL	Horoz ibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kaz ayağı -Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Fare kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa spp.</i>)	400 ml/da	Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şasırtılmasından sonra fakat yabancı otlar çıkmadan önce
ÇELTİK	Çeltiksi Darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard) F.) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.) Kız Otu (<i>Cyperus difformis</i> L.)	150 ml/da	İlaç çeltik ekiminden önce çıkış öncesi olarak doğrudan toprağa uygulanır.

İlaçın Uygulamaya Hazırlanma Şekli:

Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kaptan önce karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

KULLANMA ŞEKLİ:

Karanfil: Dekara en az 50 L. su kullanılmalı ve toprak yüzeyi tamamen ıslatılmalıdır. İlaçlamayı izleyen günlerde toprak yüzeyindeki film tabakasının bozulmaması için toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla damla sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır.

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

SERASTAR

Formülasyon şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu E 14 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

Aktif maddenin adı ve miktarı: 250 g/L. Oxadiazon

Kimyasal adı: 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Burun, boğaz, göz ve deride kaşıntı, mide bulanması.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

Tehlike özelliği: Xn : Zararlı, N : Çevre için tehlikeli

Tehlike sembolü:



Xn : Zararlı



N : Çevre için tehlikeli

İçindekiler: Oxadiazon, Cyclohexanon, Ksilen

Uygulayıcı ve çevre ile ilgili:

Risk İbaresini ve Açıklaması:

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Güvenlik İbaresini ve Açıklaması:

S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S57: Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.
S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.

Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0 232 877 17 70 Fax: 0 232 877 17 71

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

01 Şubat 2016

Dr. Nevzat BİRİŞİK

Genel Müdür Yardımcısı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Çeltik: İlaç çeltik ekiminden önce çıkış öncesi olarak doğrudan toprak yüzeyine uygulanır. Toprak yüzeyi düzgün bir biçimde ilaçlanmalı, devamında çeltiğin ekimine hazırlık için tavalara su verilmelidir. Daha sonra çeltik ekimine geçilir.

KALİBRASYON: İlaçlama aletinin deposu su ile doldurulur. İlaçlama yapılacak sahaya dolaştırılır ve ne kadar su gideceği hesaplanır. Önerilen dozda ilaç hesaplanan su ile karıştırılıp ilaçlamaya geçilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Serastar adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup E 14** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Serastar 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup E 14 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

SERASTAR

Formülasyon şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	E 14	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	-----------------------------

Aktif maddenin adı ve miktarı: 250 g/L. Oxadiazon

Kimyasal adı: 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. İlaç ile temas eden kısımları bol su ve sabunla yıkayınız. Hastayı ilaçlama sahasından hemen uzaklaştırın istirahat ettirin. İlaçla bulaşık elbiseleri hemen çıkarınız. Solunum yavaşlamış ise suni solunum yaptırınız. Baygın halde bulunan kişilere hiçbir şey yedirmeyiniz, içirmeyiniz ve de kusturmayınız.

ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
- Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- Toprak rutubetinin iyi olması gereklidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:

AGROBEST GRUP Tar.İl.Toh.İm.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.

Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0 232 877 17 70 Fax: 0 232 877 17 71


agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Y.N. 008 081 1410


Dr. Nevzat BİRİSİK
Genel Müdür

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

01 Subat 2016

Sayfa 2 / 2