

Sonround® 48 SL

Suda Çözünen Konsantr (SL)

Grubu **G** HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

480 g/l. Glyphosate asite eşdeğer glyphosate isopropylamin tuzu

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Halsizlik, hissizlik mide ağrıları görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Özel tavsiye için doktora danışın.

Yutulması halinde; Ağız suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su için. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

Cilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Göz ile teması halinde; Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel : 114



Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Glyphosate izopropilamin tuzu

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P313 Tıbbi tavsiye alın/ doktorunuza başvurun.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Çinko ve galvanizli metal kapları, bitki koruma ürününün hazırlanmasında kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 09.03.2005/5040

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
Turunçgiller, Bağ*, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar	Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar	300 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır)
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	
	Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>)	
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Yeşil horozibiği (<i>Amaranthus viridis</i>)	
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	
	Kısır brom (<i>Bromus sterilis</i>)	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>)	
	Yabani havuç (<i>Daucus carota</i>)	
	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>)	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
	Sütleğen (<i>Euphorbia spp.</i>)	
	Turnagagası (<i>Geranium dissectum</i>)	
	Ballibaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	
	Çimensi bezelye (<i>Lathyrus nissolia</i>)	
	Çayır mürdüğümü (<i>Lathyrus pratensis</i>)	
	Ebegümece (<i>Malva neglecta</i>)	
	Yabani yonca (<i>Medicago polymorpha</i>)	
	Yer fesleğeni (<i>Mercurialis annua</i>)	
Mısır hardalı (<i>Ochthodium aegyptiacum</i>)		
Kuşyemi (<i>Phalaris spp.</i>)		
Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)		
Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)		
Kanarya otu (<i>Senecio vernalis</i>)		
Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>)		
Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)		
Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)		
Zincir pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>)		
Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		

DEVAM-Sayfa 2



16 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ahmet ELMACI
Teknik Uzman

agrobest

Sayfa 1 / 3

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi Y.N. Bulvarı 1A10

Turunçgiller, Bağ*, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetiştirilme- yen Alanlar	Çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar	600 ml/da Yabancı otların genç ve olarak aktif büyüdüğü çiçeklenme öncesi devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır)
	Pelin (<i>Artemisia vulgaris</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Büyük ısırğan otu (<i>Urtica dioica</i>)	
Kara, Demir yolu kenarları, Havaalanları, Fabrika bahçeleri, Tarihi alanlar, Tarla kenarları	Çalimsı ve Odunsu Bitkilere karşı	1000 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde
Banketler, Su ve Drenaj kanalları	Banket ve su üstü yabancı otlara	1000-1500 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Sonround®48 SL

Suda Çözünen Konsantr (SL)

Grubu | G | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

480 g/l. Glyphosate asite eşdeğer glyphosate isopropylamin tuzu

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.lth.lhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMASLI
Teknik Müdür
agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tüccarlık
İmalat İli.İnat İhracat Sar. Avi. v. İc.ara
Anonim Şirketi Y.N. 000 001 1410



16 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdüğü zamanda elde edilir. Karışımın kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin odunlaşmamış yeşil kabağuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. **Sonround 48 SL** sistemik etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, bitki koruma ürününün otlara nüfuz edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işleme yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve uygulama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapmayınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Sonround 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Sonround 48 SL** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G hariç**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

Sonround® 48 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu **G** HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

480 g/l. Glyphosate asite eşdeğer glyphosate isopropylamin tuzu

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com



Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Sayfa 3 / 3

Agrobest Grup Tarım İlaçları Teknolojik
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.K. Kurul No: 1419

16 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.