

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 19.07.2006/5578

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
BAĞ*	Bağ küllmesi (<i>Erysiphe necator</i>)	3 ml / 100 L su	30 gün
ELMA	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	5 ml / 100 L su	30 gün
	Elma küllmesi (<i>Podosphaera eucotricha</i>)	6 ml / 100 L su	30 gün
ŞEKER PANCARI	Şekerpancarı yaprak lekesi (<i>Cercospora beticola</i>)	20 ml / da	30 gün
	Şekerpancarı küllmesi (<i>Erysiphe betae</i>)	15 ml / da	30 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Suns®40 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	G 1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
		400 g/l Flusilazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ

Yutulduğu, teneffüs edildiği veya deri yolu ile alındığında zararlıdır. Göz, burun, deri ve boğazı rahatsız edebilir. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Ağız suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Cilt ile teması halinde; Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Gözlerinizi ovmayınız.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Flusilazole

Zararlılık işaretleri



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

Zararlılık ifadeleri (H)

- H226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
- H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H351** Kansere yol açma şüphesi var.
- H360D** Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
- H411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem ifadeleri (P)

- P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P301+P312** YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.
- P303+P361+P353** DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın.
- P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P308+P313** Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

Kadriye İKİZÜNAL

Ruhsatlandırma Müdürü

K. İKİZÜNAL
agrobest®
GRUP

Agrobest Grup Tarım Hacıları Teahhüdünü
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

05 Temmuz 2017

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

Suns® 40 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	G 1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
400 g/l Flusilazole		

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

SUNS 40 EC sistemik etkili koruyucu ve tedavi edici özelliği olan bir fungisittir. Uygulamadan sonra 4 saat veya daha sonra yağan yağmur bitki koruma ürününün etkinliğini azaltmaz.

Bağ küllemesi:

- 1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
- 3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karalekesi:

- 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
- 4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma küllemesi:

1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70'i döküldüğünde,
3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Şekerpancarı külleme: Uygulamaya hastalık belirtileri görüldünce başlanır ve 20 ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Şekerpancarı yaprak lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Suns 40 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Suns 40 EC**'yi aynı üretim sezonu içerisinde bağda ve elmada 5'den fazla, şeker pancarında ise 2'den fazla uygulamayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G1:3** harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında pek çok bitki koruma ürünü ile ön karışım testi yapmak şartıyla karıştırılabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Çayır, mera ve tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmayı önleyiniz.
- Bitki koruma ürünü ambalajını ateşten ve kıvılcımdan uzak bir yerde muhafaza ediniz.
- YANICIDIR.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA
Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobrestgrup.com

Kadriye İKİZÜNAL
Ruhsatlandırma Müdürü

agrobrest
GRUP

Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tahvilcilik
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

05 Temmuz 2017

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V