

Volarinex®

Süspansiyon Konsantré (SC)

Grubu | G,9 | E,14 | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu
+30 g/l Oxyfluorfen

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Şüphe durumunda derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın.

Cilt ile teması halinde; kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel : 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu ve Dönemi
ZEYTİN	Duvar arpası (<i>Hordeum murinum</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Gri lekeli amarant (<i>Amaranthus lividus</i>) Boya otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Kırmızı çiçekli ballıbaba (<i>Lamium purpureum</i>) Turna gagası (<i>Geranium dissectum</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>) Yonca (<i>Medicago polymorpha</i>) Sirken (Kazayağı) (<i>Chenopodium album</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
TURUNÇGİL	Yeşil horoz ibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Dikenli eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Duvar arpası (<i>Hordeum murinum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Tüysüz hanım döşeği (<i>Euphorbia serpens</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani bamyâ (<i>Hibiscus trionum</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>)	200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Glyphosate izopropilamin tuzu, Oxyfluorfen, Propane 1,2-diol

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H315** Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P332 + P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P362+ Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P364 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P501 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü ile hazırlanan karışımı hedef yabancı otlara püskürtünüz. Uygulama esnasında civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.

Volarinex®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu | G,9 | E,14 | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu
+30 g/l Oxyfluorfen

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

KAYISI, ŞEFTALİ	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
	Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	300 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİL- MEYEN ALANLAR	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	300 ml/da Çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönem

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobrestgrup.com

Volarinex®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	G,9	E,14	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	------	-----------------------------

360 g/l Glyphosate isopropylamin tuzu+30 g/l Oxyfluorfen

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. Karışımın kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. **Volarinex** sistemik etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, bitki koruma ürününün otlara nüfuz edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işleme yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve uygulama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapmayınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Volarinex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G,9/E,14** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Volarinex** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G,9/E,14 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com