

Agrobest Similis® 80 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	K3/N:15	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	---------	----------------------------

800 g/L Prosulfocarb

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde, tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Kusturmaya çalışmayın. Ağız suyla iyice çalkalayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Kirlenmiş cildi hemen suyla yıkayın. Giysiler iyice ıslanmış iseler çıkarın ve cildi suyla yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Hemen üzerine en az 15 dakika devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tahriş devam ederse bu talimatları yanınıza alıp su akıtmaya devam ederek hastaneye götürün. Hemen bol su ile yıkayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” Tel: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Prosulfocarb, Calciumdodecylbenzenesulfonate, Isobutanol

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210	Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P240	Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın.
P241	Patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman kullanın.
P243	Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P261	Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P273	Çevreye verilmesinden kaçının.
P280	Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301+P312	YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P302+P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303+P361+P353	CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın veya duş alın.
P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305+P351+P338	GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanım Dozu ve Zamanı
PATATES	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Sü�ürge otu (<i>Polygonum bellardii</i>) Şeytan elması (<i>Datura stromonium</i>) Anadolu şahteresi (<i>Fumaria kralikii</i>) Yoğurt otu (<i>Galium sylvaticum</i>) Kara yonca (<i>Medicago lupulina</i>) Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	500 ml/da (Çıkış öncesi)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Agrobest Similis® 80 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	K3/N:15	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	---------	----------------------------

800 g/L Prosulfocarb

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Patates ekiminden sonraki 1 hafta içerisinde, tarlaya sürgü çekiminden hemen sonra, yabancı otlar henüz çıkış yapmadan (pre- em) önceki dönemde uygulanmalıdır. Toprak herbisitlerinden en iyi sonuç için tohum yatağı keseksiz ve toprakta yeterli rutubet bulunması istenir.

KISITLAMALAR: Kuraklık, su baskını, zararlı yoğunluğu, hastalık şiddeti, don veya yüksek gece-gündüz sıcaklık farklılığının bulunduğu dönemlerde söz konusu Bitki Koruma Ürünü ile ilaçlama yapmayınız.

Münavebe Ürünlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

Patates ekiminden sonra olası bir olumsuzluk durumunda;

6 Ay sonra Toprak İşleme Yapılmadan (Direkt Ekim); Ayçiçeği, Mısır,

Keten, Yulaf, Arpa, Buğday, Kanola, Soya Fasulyesi.

6 Ay sonra Toprak İşleme Yapılarak; Havuç, Marul, Şeker Pancarı, Patates, Yerfıstığı ekilmesi güvenlidir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında **Agrobest Similis 80 EC** ruhsatlı olduğu kültür bitkileri tarafından çok iyi derecede tolere edilir. Doğru ekim tekniklerine uygun olarak buğday tohumlarının tamamı toprak altında kalacak şekilde (en az 3 cm derinlikte) uygulama yapılması ile ürün güvenliği sağlanmış olur. Ekim sonrası oluşan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek yüzey akışlarıyla yabancıot kontrolünde düşüşler yaşanabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Agrobest Similis 80 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup K3/N:15** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Agrobest Similis 80 EC'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup K3/N:15 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” Tel: 114

P321

Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).

P370+P378

Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.

P391

Döküntüleri toplayın.

P501

İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401

İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki koruma ürününün dökülmesi halinde, üzerine talaş, kil toprak dökünüz, sonra dikkatlice süpürüp toplayınız ve uygun bir yere gömünüz.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımdan doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com