

Albert® 75 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	B	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

%7,5 Pyroxulam + %7,5 Cloquintocet-mexyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Gözde geçici hafif tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde, Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde, Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Ciltle teması halinde, Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. Bol sabun ve su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde, Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu ve Dönemi
DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR		
BUĞDAY	Rüzgar otu (<i>Apera spica-venti</i>)	20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kısır brom=Kıraç çayı (<i>Bromus sterilis</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Çok çiçekli delice (<i>Lolium multiflorum</i>) İtalyan çimi (<i>Lolium perenne</i>) Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Küçük başaklı kuşyemi (<i>Phalaris minor</i>) Yumrulu salkım otu (<i>Poa bulbosa</i>)	25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR		
BUĞDAY	Kandamlası (<i>Adonis flammea</i>) Boylu papatya (<i>Anthemis altissima</i>) Avusturya köpek papatyası (<i>Anthemis austriaca</i>) Boyacı papatyası (<i>Anthemis tinctoria</i>) Tarla papatyası (<i>Anthemis fumariifolia</i>) Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>) Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Rum yalancı keteni (<i>Camelina rumelice</i>) Suriye turpu (<i>Chorispora syriaca</i>) Tarla hazeranı (<i>Consolida regalis</i>) Yabancı havuç (<i>Daucus carota</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurania sophia</i>) Baca otu (<i>Euclidium syriacum</i>) Pekmez hardalı (<i>Erysimum repandum</i>) Dil kanatan = Yapışkan otu (<i>Galium aparine</i>) Kıraç ıtırı (<i>Geranium stepporum</i>) Yağlıot (<i>Gypsophila pilosa</i>) Yabancı çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Topluğne hardalı (<i>Neslia paniculata</i>) Yabancı turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pyroxulam, Cloquintocet-mexyl, Kaolen

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261 Tozunu solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

Albert® 75 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	B	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

%7,5 Pyroxulam + %7,5 Cloquintocet-mexyl

BUĞDAY	Küçük turp = Yabani turp (<i>Rapistrum rugosum</i>) Yapışkan nakil (<i>Silene conoidea</i>) Süpürgeotu (<i>Sisymbrium altissimum</i>) Kuşotu = Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Adi fiğ = Yabani fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
BUĞDAY	Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Yabani krizantem (<i>Chrysanthemum segetum</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Acı yavşan otu (<i>Veronica cymbalaria</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)	25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı

(* Yayıcı-yapıştırıcı, yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka Albert 75 WG ile birlikte kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ETKİ ŞEKLİ:

Albert 75 WG, buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili bir herbisit olup, yapraklar ve kısmen de kökler tarafından alınarak yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. İlacın etkili maddesi Acetolactate synthase (ALS) inhibitörü olduğundan bitki büyüme metabolizmasını bozar ve hedef türleri ölüme götürür. Uygulamayı takiben yabancı otların büyümesi hızla durur. Ancak ölmekte olan bitkilerde renk değişimi gibi semptomların oluşması, şartlara ve yabancı otların hassasiyetine göre değişmekle beraber uygulamadan 1 ila 3 hafta sonra görülmeye başlar.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- **Albert 75 WG** ekmeklik buğday çeşitlerinde kullanılır, makarnalık çeşitlerde kullanılması tavsiye edilmez.
- **Albert 75 WG** aynı pakette verilen yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
- Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk, aşırı yağış, gibi nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San. Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Albert® 75 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	B	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

%7,5 Pyroxulam + %7,5 Cloquintocet-mexyl

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Albert 75 WG aynı pakette birlikte verilen yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Yayıcı-yapıştırıcı ilacın etkisini güçlendirir ve yabancı otlara olan etkisini artırır.

Albert 75 WG yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (geniş yapraklı yabancı otların 4-6 yapraklı, dar yapraklıların 1-2 kardeşli oldukları dönem) buğdayın kardeşlenme dönemi ortasından sapa kalkma başlangıcına kadar olan devrede kullanılmalıdır. Yabancı otların kıştan çıkışta gösterdikleri durgun dönem atlatılmadan, yani ilkbaharda gelişme yeniden başlamadan önce kullanmayınız.

Buğdayın kardeşlenme başlangıcı gibi erken dönemlerinde uygulanması tavsiye edilmez. Hava sıcaklığının 5 °C'nin altında olduğu dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez. Hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.

MÜNAVEBE BİTKİLERİNE ETKİSİ

Albert 75 WG uygulanan buğdaydan sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Albert 75 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup B** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Albert 75 WG** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup B harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışım yapılacak ise, ön karışım testi yapılması önerilir.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San. Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com