

Best Captan® 50 WP

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	M 4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

% 50 Captan

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Deri, göz, burun ve boğazda tahriş yapabilir. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Kusturmaya çalışmayın. Tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın. Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Cilt ile teması halinde; Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Toksisitesi düşük olup özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 09.12.2004/4928

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ARMUT	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	150 g/100 L su	14 gün
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g/100 L su	14 gün
ERİK	Cep hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	300 g/100 L su	14 gün
ŞEFTALİ, KIRAZ, VIŞNE	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa=Sclerotinia laxa</i>)	300 g/100 L su	14 gün
ŞEFTALİ, KAYISI	Yaprak Delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	300 g/100 L su	14 gün
TURUNÇGİLLER	Turuncgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/100 L su (Meyve enfeksiyonları)	28 gün
YENİDÜNYA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i> var. <i>eriobotryae</i>)	300 g/100 L su	14 gün
BAĞ**	Ölükol (<i>Phomopsis viticola</i> *)	250 g/100 L su (Yaz Uygulaması)	28 gün
	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/100 L su	28 gün
SEBZE FİDELERİ***	Kök Çürüklüğü (Çökerten) (<i>Pythium</i> spp, <i>Fusarium</i> spp, <i>Rhizoctonia</i> spp, <i>Alternaria</i> spp, <i>Sclerotinia</i> spp, <i>Phytophthora</i> spp.)	200-250 g/100 L su	28 gün
DOMATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	300 g/100 L su	14 gün
	Yaprak küfü (<i>Cladosporium fulvum</i>)	250 g/100 L su	14 gün
	Sebzelerde Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 g/100 L su	14 gün
MARUL	Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	300 g/100 L su	28 gün
SOĞAN	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	300 g/100 L su	28 gün

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Captan, Kaolen

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P261 Buharını/ spreyni solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301 + P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P302+ P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+ P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+ P351+ P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P333+ P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P403+ P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



Best Captan® 50 WP

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	M 4	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	-----	-------------------------

% 50 Captan

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

PATATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	350 g/ 100 L su	28 gün
KARANFİL (Süs Bitkisi)	Pas (<i>Uromyces caryophyllus</i>)	250 g/100 L su	14 gün
TÜTÜN (Fidelik)	Çökerten (<i>Pythium spp</i> , <i>Fusarium spp</i> , <i>Rhizoctonia spp</i> , <i>Alternaria spp</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	200 g/100 L su	28 gün

*Yaz uygulamasında kullanılır.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

***Fidelik uygulamalarında verilen iki doz hastalığın yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut – Karaleke:

Dal sıracası yok ise:

- 1. uygulama;** çiçek gözleri kabardığında,
- 2. uygulama;** beyaz rozet döneminde,
- 3. uygulama;** çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
- 4.ve diğer uygulamalar;** hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8 – 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma – Karaleke:

- 1. uygulama;** çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3 – 5 gün önce yapılır),
- 2. uygulama;** pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görülünce),
- 3. uygulama;** çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
- 4. ve diğer uygulamalar;** ekolojik koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 8 – 10 gün ara ile yapılır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA

Best Captan® 50 WP

İslanabilir Toz (WP)

Grubu	M 4	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	-----	-------------------------

% 50 Captan

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Erik – Cep Hastalığı:

- uygulama;** tomurcuklar kabardığı dönemde,
- uygulama;** çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali, Kiraz, Vişne – Çiçek monilyası:

- uygulama;** çiçeklenme başlangıcında (% 5 – 10 çiçekte),
- uygulama;** tam çiçeklenmede (% 90 – 100 çiçekte)

Şeftali, Kayısı – Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Çil):

- ilaçlama:** Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
- ilaçlama:** ilkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgiller – Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması:

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

- uygulama;** sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
- uygulama;** havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarına karşı:

Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1 – 1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Yenidünya – Karaleke:

- uygulama;** sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,
- uygulama;** çiçek tomurcukları açılmadan önce,
- uygulama;** çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,
- ve diğer uygulamalar;** 3. uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ – Ölükol:

*Yaz Uygulaması:

- uygulama;** sürgünler 2 – 3 cm olduğunda,
- uygulama;** sürgünler 8 – 10 cm olduğunda,
- uygulama;** sürgünler 25 – 30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ – Mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25 – 30 cm. ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10 – 15 gün ara ile uygulama yapılır.

Sebze Fideleri – Kök Çürüklüğü ve Çökerten:

Fidelikte hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2 – 3 kez bir hafta ara ile uygulama yapılır.

Domates – Mildiyö:

Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3 – 5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 – 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

RUHSAT SAHİBİ FIRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihi/MANISA



Best Captan® 50 WP

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	M 4	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	-----	-------------------------

% 50 Captan

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Domates – Yaprak Küfü:

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15 – 20 gün kala uygulama kesilmelidir.

Domates – Sebzelede Kurşuni Küf:

Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.

Marul – Mildiyö:

Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülünce hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı, birer hafta aralarla devam edilmelidir. Fidelikte uygulama, sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

Soğan – Mildiyö:

Günlük ortalama sıcaklığın 16 °C'ye ulaşması ve orantılı nemin % 80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Patates – Mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Karanfil (Süs Bitkisi) – Pas:

Çelikler sıraya geçirilmeden önce uygulamaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile uygulamalar yapılmalıdır.

Tütün (Fidelik) – Çökerten:

Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Best Captan 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M4** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Best Captan 50 WP'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M4 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışıma ihtiyaç duyulması halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA