

## Best Ester® 48 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	O 4	HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
-------	-----	----------------------------

480 g/l 2,4-D aside eşdeğer Isooctylester

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bitki koruma ürünü ağızdan alındığında kusma, ishal reflekslerde azalma, vücut faaliyetlerinde düzensizlik görülür.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde;** Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumu gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde;** Ağzı suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Eğer kolayca bulunabiliyorsa, su yerine süt verin. Kazazedeye gözlem altında tutun. Kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuşun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Hemen tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Cilt ile teması halinde;** Kirli giysileri hemen çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın. **Göz ile teması halinde;** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. İlacın sindirim yolu ile alındığından şüpheleniliyorsa, mide tuzlu su alınmasını müteakip ılık su ile yıkılarak boşaltılmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 18.10.2004/4853

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
HUBUBAT	Kandamlası ( <i>Adonis flamma</i> ) Karamuk ( <i>Agrostemma githago</i> ) Farekulağı ( <i>Anagallis arvensis</i> ) Siğirdili ( <i>Anchusa officinalis</i> ) Tarla köpek papatyası ( <i>Anthemis arvensis</i> ) Tarla Yapışkan ot ( <i>Asperula arvensis</i> ) Sarı ot ( <i>Boreava orientalis</i> ) Taşkesenotu ( <i>Buglossoides arvensis</i> ) Çan çiçeği ( <i>Campanula spp.</i> ) Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Yabani tere ( <i>Cardaria draba</i> ) Küçük pıtrak ( <i>Caucalis platycarpus</i> ) Pelemir ( <i>Cephalaria syriaca</i> ) Gökbaş ( <i>Centaurea cyanus</i> ) Peygamber çiçeği ( <i>Centaurea depressa</i> ) Boynuz otu ( <i>Cerastium arvense</i> ) Yabani hindiba ( <i>Cichorium intybus</i> ) Suriye turpu ( <i>Chorispora syriaca</i> ) Köygöçüren ( <i>Cirsium arvense</i> ) Doğu tarla hazerani ( <i>Consolida orientalis</i> ) Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Yabani karanfil ( <i>Dianthus anaticus</i> ) Dönbaba ( <i>Erodium cicutarium</i> ) Çırcır otu ( <i>Erophilla verna</i> ) Sütleğen ( <i>Euphorbia microsphaera</i> ) Anadolu şahteresi ( <i>Fumaria kralikii</i> ) Adi şahtere ( <i>Fumaria vaillantii</i> ) Yumrulu jeranyum ( <i>Geranium tuberosum</i> ) Yabani çivit otu ( <i>Isatis tinctoria</i> ) Dikenli yabani marul ( <i>Lactuca seriola</i> ) Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Yabani mürdümük ( <i>Lathyrus aphaca</i> ) Yabani ebegümece ( <i>Malva sylvestris</i> )	125-166 ml/da Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken, yüksek dozlar geç dönemde) uygulanır

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER 2,4-D isooctylester, Ksilen

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### UYARI KELİMESİ: DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226** Alevlenir sıvı ve buhar.  
**H302+** Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.  
**H332**  
**H315** Cilt tahrişine yol açar.  
**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
**H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.  
**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P210** Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.  
**P242** Sadece ateş almayan aletler kullanın.  
**P243** Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
**P261** Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.  
**P273** Çevreye verilmesinden kaçının.  
**P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
**P403 + P235** İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.  
**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

## Best Ester® 48 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	04	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	----	-----------------------------

480 g/l 2,4-D aside eşdeğer Isooctylester

<b>HUBUBAT</b>	<p>Papatya (<i>Matricaria</i> spp.) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Gönül hardalı (<i>Myagrum perforiatum</i>) Trakya hardalı (<i>Neslia apiculata</i>) Topluğne hardalı (<i>Neslia paniculata</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Muhabbet çiçeği (<i>Reseda lutea</i>) Zühretarağı (<i>Scandix pecten-veneris</i>) Yapışkan nakıl (<i>Silene conoidea</i>) Renkli nakıl (<i>Silene colorata</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Yemlik (<i>Tragopogon latifolius</i>) Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>) Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>) Yavşan otu (<i>Veronica</i> spp.) Yabani fiğ (<i>Vicia</i> spp.)</p>	<p>125-166 ml/da Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken, yüksek dozlar geç dönemde) uygulanır</p>
----------------	--	--

\*Monokültür tarım yapılan bölgelerde Tavsiye edilir.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.
- Buharlaşıma özelliğine sahip olduğundan uygulama esnasında diğer bitkilere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
- Tavsiye edilen müddetten evvel veya sonra kullanılırsa hububatta hafif yanmaya sebep olur.

### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com

## Best Ester® 48 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	<b>O 4</b>	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	------------	-----------------------------

480 g/l **2,4-D aside eşdeğer Isooctylester**

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Çok rüzgârlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 ° C'den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.

**Fitotoksosite:** Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.

### DİRENÇ YÖNETİMİ

**Best Ester 48 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup O 4** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Best Ester 48 EC** ilacını bir sezon içinde 1 kez'den fazla kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup O 4 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

### RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com