

Bio Nematon®

Sıvı formülasyon (SL)

Grubu	--	Biyolojik Nematosisit (Nematod ilacı)
-------	----	---------------------------------------

Paecilomyces lilacinus strain PL1
% 1.5 (1x10⁸ kob/ml min)

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Yutulursa ve/veya solunursa mide bulantısı, mide rahatsızlıkları görülebilir. Cilt ve göz ile temas durumunda hafif tahriş görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alın. Doktor çağırın, BKÜ ambalaj ve etiketini birlikte götürün. Yutulması halinde hastayı kusturmayın, derhal tıbbi yardım isteyin. Hasta kendinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Solunum durumunda açık havaya çıkın. Gerekirse yapay solunum yapın. Cilt ile temas durumunda Bitki koruma ürünüyle bulaşık giysileri çıkarın ve cildi 15-20 dakika bol sabun ve su ile yıkayın. Göz ile temas durumunda ise en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 28.03.2011/8263

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
DOMATES (sera)	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	5 ml/litre su Larva
HIYAR (örtü altı)	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	5 ml/litre su (500 ml/da) Larva
BİBER (sera)	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	5 ml/litre su Larva
PATATES	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>)	500 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar suyla doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Kalibrasyon:

Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Hıyar (sera) Kök ur nematodu için dekara ortalama 100 l. su kullanılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulama, damlama sulama sistemi ile her bir uygulama için litre başına 5 ml bitki koruma ürünü verilerek yapılır. Uygulamadan önce damlama sulama sistemi bir saat açık bırakılır, daha sonra uygulamaya geçilir ve uygulama yarım saat içinde bitirilir. Uygulama esnasında toprağın tavadı olmasına dikkat edilir. Bitki koruma ürününün kök sistemine ulaşması için uygulamadan sonra damlama sulama sistemi 15 dakika daha çalıştırılır. Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH'sı 4,5-8,5 arasında olmalıdır.

Net miktarı: (kg veya l)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Paecilomyces lilacinus

Zararlılık ifadeleri (H)

NC Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

Uyarı Kelimesi: -

Önlem ifadeleri (P)

P280	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501	İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401	İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile BKÜ'nün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar BKÜ'nün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar BKÜ'nün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

T.Stanes And Company Limited

8/23-24 Race Course Road, Coimbatore 641 018 – Hindistan

Tel: 91-422-2221514,2223515, **Fax:** 91-422-217857,217432

www.agrobestgrup.com

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.lth.İhr. San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com

Bio Nematon®

Sıvı formülasyon (SL)

Grubu	--	Biyolojik Nematosisit (Nematod ilacı)
-------	----	---------------------------------------

Paecilomyces lilacinus strain PL1
% 1.5 (1x10⁸ kob/ml min)

Domates, Hıyar ve Biber (Kök ur nematodu):

1.Uygulama: Dikimden 15 gün önce, serada kullandığımız su miktarına göre litre başına 5 ml. **Bio-Nematon** uygulanır.

2.Uygulama: Fideleri seraya aktarmadan 1 gün önce uygulanır. Kullandığımız su miktarına göre litre başına 5 ml. **Bio-Nematon** uygulanmalıdır.

3.Uygulama: Dikimden 6-8 hafta sonra kullandığımız su miktarına göre litre başına 5 ml. **Bio-Nematon** uygulanmalıdır.

Uygulamalardan sonra damlama sulama sistemi 15 dakika çalıştırılarak bitki koruma ürününün kök boğazına inmesi sağlanır.

Uygulamalarda dekara ortalama 100 l. su kullanılmalıdır.

Patates (Kök ur nematodu):

1.Uygulama patates dikiminden hemen önce toprağa yapılmalıdır. **2. 3. ve 4. uygulamalara** 21 gün ara ile devam edilir. Uygulamalar yapıldıktan sonra 15 dakika sulama sistemi çalıştırılarak bitki koruma ürününün toprak içerisine nüfuz etmesi sağlanır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak, dekara 40 l/su gelmesi sağlanmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Paecilomyces lilacinus fungusunun sporları, nematodlar ile temasa girdiklerinde gelişmeye başlarlar. Büyüyüp çoğalarak nematodları felç eder ve öldürürler.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bio-Nematon'u fungusitler ile karıştırmayın. Bir **Bio-Nematon** uygulaması ile bir fungusit uygulaması arasında en az 15 gün beklenmesi tavsiye edilir.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

T.Stanes And Company Limited

8/23-24 Race Course Road, Coimbatore 641 018 – Hindistan

Tel: 91-422-2221514,2223515, Fax: 91-422-217857,217432

www.agrobestgrup.com

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com