

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ / ŞEKLİ (TOPRAKTAN UYGULAMA)	UYGULAMA DOZU
TAHILLAR	1.Uygulama: Sürgün oluşumu ve sap uzama döneminde 2.Uygulama: Başaklanma ile çiçek oluşumu dönemleri arasında	100 ml/da (134 g/da)
DOMATES PATLICAN vs.	Yeterli yapraklanma olduğunda	100 ml-150 ml/100 L su (134-200 g/100 L su)
ZEYTİN	1.Uygulama: Hasat Sonrası veya budama sonrası 2.Uygulama: Çiçeklenmeden önce	100 ml/100L su (134 g/100 L su)
BAĞ	1.Uygulama: Hasattan sonra 2.Uygulama: Budamadan sonra Gözler kabarmaya başlamadan önce	100 ml/100L su (134 g/100 L su)
NARENCİYE	1.Uygulama: Hasattan sonra kuru dallar temizlendikten sonra 2. Uygulama: Yağışlar başlamadan (Ekim-Kasım Ayları) ilk uygulama	100 ml/100L su (134 g/100 L su)
ELMA, ARMUT	1.Uygulama: Kış periyodu boyunca/budamadan sonra 2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının yeni kabardığı dönemde	100 ml/100L su (134 g/100 L su)
KIRAZ, VIŞNE ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK	1.Uygulama: Yaprak dökümünden sonra – budamadan sonra 2.Uygulama: Çiçekler açılmadan, tomurcukların yeni kabardığı dönemde	100 ml/100L su (134 g/100 L su)
CEVİZ, BADEM, FINDIK, KİVİ, ANTEPFISTIĞI	1.Uygulama: Kış periyodu boyunca-budamadan sonra 2.Uygulama: İlkbaharda tomurcukların yeni kabardığı dönemde	100 ml/100L su (134 g/100 L su)

1000 ml = 1340 g

KULLANIM ŞEKLİ: Bitkilerin erken gelişim dönemiyle birlikte, yeterli yapraklanmadan itibaren kullanılabilir. Tek yıllık bitkilerde 3 yapraklı dönemden önce kullanılmamalıdır. Kullanılacak doz, yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları, zeytin ve bağda genel olarak 100 litre suya 100 gr'dır. 10-15 gün ara ile 2 uygulama olarak tavsiye edilmektedir. Bir sezonda en çok 3 uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir. Alınacak sonuçlar ve verim, iklim, bitki, toprak özellikleri vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme programları geliştirilmesi tavsiye edilir.

EC FERTİLİZER
BAKIRLI GÜBRE SÜSPANSİYONU
(Bakır Oksiklorür İçerikli)

BRANDT Cu Trax

Garanti Edilen İçerik	% w/w
Toplam Bakır (Cu)	20

UYARILAR:

- * Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- * Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- * Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- * Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayı imha ediniz.
- * Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.



Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Net Ağırlık:
Lisans Numarası :
Tescil Numarası :

DEPOLAMA DURUMU: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

İTHALATÇI FİRMA

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth. İhr.San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61
Kemalpaşa/İZMİR Tel: +90 232 877 17 70 Faks: +90 232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

BRANDT