

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası : (damga)  
Ruhsatname tarihi ve numarası: 12.07.2007/6050

#### ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER

Bitki Adı	Uygulama Amacı	Uygulama Dozu
PAMUK	Aşırı büyümeyi önler erkencilik sağlar	<b>Dozu: 100 ml/da</b> Çiçek başlangıcı ile çiçek doruğu arasında veya tarak başlangıcından itibaren 25-50 ml/da 10-15 gün ara ile 3-4 tatbikat
SOĞAN VE SARMISAK	Verim artışı sağlar	<b>Dozu: 100 ml/da</b> <b>Soğan:</b> Tohumdan üretilen soğanda ekimden 3-3,5 ay sonra, soğan 4-5 yapraklı iken, arpacıktan üretilen soğanlarda dikimden yaklaşık 2,5 ay sonra. <b>Sarımtrak:</b> Dikimden yaklaşık 2,5 ay sonra
YER FISTIĞI	Verim artışı sağlar	<b>Dozu: 150 ml/da</b> Çiçek başlangıcı ve tam çiçek döneminde

#### ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

agrobest®  
GRUP

Cot-Pax®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	BGD (Bitki Gelişim Düzenleyicisi)
-------	--------------------------------------

50 g/L Mepiquat chloride

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde;** Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

**Yutulması halinde;** Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Hemen tıbbi yardım alın.

**Cilt ile teması halinde;** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde;** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

#### ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur; Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

Net miktarı: (kg veya L)  
Azami perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Mepiquat chloride, Su

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### UYARI KELİMESİ: DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ:(H)

- H302** Yutulması halinde zararlıdır.  
**H412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:(P)

- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için, uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.



# Cot-Pax®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	BGD (Bitki Gelişim Düzenleyicisi)
-------	--------------------------------------

50 g/L Mepiquat chloride

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Pamukta Kullanılması:** Cot-Pax pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.

**Cot-Pax'ın sağladığı yararlar:** Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki olur, böylece sıra araları daha geç kapanır.

-Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir.

Daha az tarak ve elma dökümü, daha iri kozalar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat olur.

**Cot-Pax uygulamasında nelere dikkat edilmelidir:** Cot-Pax etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için;

-Pamuk tarlalarında yabancı ot ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.

-Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzeni uygulanmalıdır.

**Cot-Pax uygulama zamanı:** Cot-Pax için en uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden 2 haftalık süre içerisinde. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkânlarına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir.

**Cot-Pax Uygulama Dozu:** Cot-Pax genel olarak bir defada ve **100 ml/da** dozda uygulanır. Cot-Pax uygulanan tarlada anormal derecede vejetatif bir gelişme olursa birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra **50 ml/da** dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir.

**Parçalı uygulama:** Cot-Pax'ın yüksek dozda bir defada kullanılması yerine bu dozun 3 veya 4'e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece Cot-Pax tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz olan veya fazla boylanmayan pamuklardada Cot-Pax kullanılabilir ve Cot-Pax'ın sağladığı faydalardan istifade edebilir.

Parçalı uygulamada Cot-Pax dozları;

**1.uygulama: 25 ml/da** (Tarak başlangıcı)

**2.uygulama:25-50 ml/da** (1.suyun önüne veya gelişme zayıfsa sudan sonra)

**3.uygulama:25-50 ml/da** (2.uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2.suyun önüne)

**4. uygulama 25 ml/da** (Pamukta büyüme devam ediyorsa atılmalıdır)

**Cot-Pax yer aletleri** ile dekara en az 20 lt. su ile atılmalıdır veya Cot-Pax uygulama zamanı diğer haşere bitki koruma ürünlerinin uygulama zamanına tesadüf ediyorsa haşere bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmalıdır.

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com

## ÜRETİM TESİSİ

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA



## Cot-Pax®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	BGD (Bitki Gelişim Düzenleyicisi)
-------	--------------------------------------

50 g/L Mepiquat chloride

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

**Soğan ve sarımsakta kullanılması:** Cot-Pax soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.

**Kullanma zamanı:** Tohumdan baş soğan üretiliyor ise Cot-Pax' in en uygun uygulama zamanı ekimden 3-3.5 ay sonradır. Bu dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup 20-25 cm boydadır ve baş bağlamaya başlamıştır.

Eğer arpacıktan baş soğan yetiştiriliyor ise Cot-Pax' in uygulama zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. Cot-Pax' in sarımsakta uygulama zamanı arpacık soğanda olduğu gibidir. Gerek soğanda ve gerekse sarımsak ta dikkat edilmesi gereken husus, Cot-Pax' in baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

**Yer fıstığında kullanılması:** Cot-Pax yer fıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının % 25-30 oranında olduğunu göstermiştir. Cot-Pax yer fıstığında çiçeklenme başlangıcı ve tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamadan alınmıştır. Cot-Pax yer fıstığında bir defada **150 ml/da** dozda kullanılır.

### **KARIŞABİLİRLİK DURUMU**

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

### **RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com

### **ÜRETİM TESİSİ**

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA