

## Delaxtore® 200 sL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	H,10	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	-----------------------------

200 g/Litre Glufosinate-ammonium

- Önce Etiketini Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İçice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde,** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarıp, rahat nefes alabileceği ve sıcak tutulacağı şekilde dinlendirin. Özel tavsiye için doktora danışın.

**Yutulması halinde:** Ağzı suyla iyice çalkalayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

**Cilt teması halinde,** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

**Göz teması halinde,** Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114**

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:

### KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu
MEYVE BAĞ* TURUNÇGİL BAHÇELERİ	Tilki kuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	
	Püsküllü çayır ( <i>Bromus tectorum</i> )	
	Yabani dikenli marul ( <i>Lactuca serriola</i> )	
	Eşek marulu ( <i>Sonchus spp.</i> )	
	İmam kavunu ( <i>Senecio vulgaris</i> )	
	Yabani yonca ( <i>Medicago spp.</i> )	
	Turna gagası ( <i>Geranium spp.</i> )	
	Sinir otu ( <i>Plantago spp.</i> )	
	Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )	
	Sirken (Kaz ayağı) ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Çatal otu ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )	
	Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> )	
Köpek dişi ayrığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )		
Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )		
Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

### UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcısı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Glufosinate Ammonium

### Zararlılık işaretleri:



Uyarı Kelimesi: TEHLİKE

### Zararlılık ifadeleri (H)

- H302 + H332** Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H360F** Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### Önlem ifadeleri (P)

- P270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
- P405** Kilit altında saklayınız.
- P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.lth.lhr. San.Tic.A.Ş.  
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com

## Delaxtore® 200 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	H,10	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	-----------------------------

200 g/Litre Glufosinate-ammonium

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulamada en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Dekara 20-40 litre suyla, düşük basınçlı aletlerle ve yelpaze huzmeli memeler kullanılarak uygulama yapılır. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabağına bitki koruma ürünü temas etmemelidir. Bitki koruma ürününün etki şekli sistemik olduğundan, ürünün etkisinin azalmaması için uygulama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işleme yapılmamalıdır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**Delaxtore 200 SL** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup H,10** olarak sınıflandırılan bir Herbisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Delaxtore 200 SL** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup H,10 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

### KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

### RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.ToH.lml.lth.lhr. San.Tic.A.Ş.  
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com