

Son - Final®  
Efhun®  
Kozagri®

KOZA  
AÇIMI

YAPRAK  
DÖKÜMÜ

YÜKSEK  
KALİTE

# PAMUK HASAT YARDIMCILARINIZ

Bitkiler Korumamız Altında

agrobest®  
GRUP

SC (Süspansiyon Konsantre)  
480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide  
SL (Suda Çözünen Konsantre)  
480 g/l Ethephon  
SL (Solüsyon Konsantre)  
720 g/l Ethephon

**Son-Final®**  
**Efhun®**  
**Kozagri®**

SON-FİNAL®			
Bitki Adı	Uygulama Amacı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
PAMUK	Kozanın açılmasını hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak, yaprak dökümü ile hasadı kolaylaştırmak ve pamuğu makineli hasada hazırlamak.	200 ml/da Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçak ile kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahverengi olduğunda) pratik olarak kozalar %25-30 açmış olduğunda	7 gün

**Hasat:** Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayıba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.

EFHUN®		
Bitki Adı	Uygulama Amacı	Uygulama Dozu ve Dönemi
PAMUK	Koza açımını teşvik etmek ve yeknesak hasat sağlamak	300 ml/da 2. ürün ve geç ekim pamuklarda kozaların %25-30'u açtığına koza açtırıcı olarak kullanılır.

**Hasat:** Ürün uygulandıktan sonra normal tarım tekniklerinin uygulanmasına devam edilmeli ve en uygun hasat zamanını belirlemek için tarla yakından gözlenmelidir.

KOZAGRI®			
Bitki Adı	Uygulama Amacı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
PAMUK	Koza açtırıcı ve yaprak döktürücü	200 ml/da En iyi sonucu almak için kozaların % 35'i açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar % 60'ı geçmemelidir.	14 gün

**Hasat:** Bitki koruma ürününden beklenen üstün sonuçların alınması için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Bitki koruma ürünü uygulaması üzerinden 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı ancak bir kayba da meydan vermemek üzere hasat çok da geciktirilmemelidir. Normal şartlarda Kozagri uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra hasat yapılması uygundur.

! \*Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.  
! \*Kullanmadan önce mutlaka ürün etiket bilgilerini okuyunuz.