

Estival® sc 400

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2,7	Nematisit (Nematod ilacı)
-------	------	---------------------------

400 g/L Fluopyram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 4 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Burun ve ağzı su ile yıkayın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Hemen tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Ağzı hemen çalkalayın ve temiz havaya çıkarın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş cildi hemen sabun veya hafif deterjan ve suyla yıkayın. Giysiler iyice ıslanmışsa çıkarın ve cildi suyla yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Hemen üzerine bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Bir ambulans çağırın bu talimatları yanınıza alıp su akıtmaya devam ederek hastaneye götürün. Hemen tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL:114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fluopyram

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P391** Döküntüleri toplayın.
- P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
HIYAR (Sera)	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/ da	7 gün
KORNIŞON (Sera)	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/ da	7 gün
PATATES	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	120 ml/ da	--
DOMATES (Sera)	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/ da	7 gün
BİBER (Sera)	Kök ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/ da	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Domates (sera), biber (sera), hıyar (sera), kornişon (sera) için: Önce damlama sulama sistemi çalıştırılarak toprak tarla kapasitesine gelene kadar su verilir. Daha sonra birim alana uygulanacak ürün miktarı ayrı bir kapta hazırlanıp damlama sulama sistemiyle uygulama alanına verilir ve arkasından 15-20 dakika tekrar temiz su verilerek ürünün toprağa nüfuz etmesi sağlanır. Sulama ve uygulamalar sırasında suyun homojen olarak dağılmasına ve bitkinin etkili kök bölgesine inmesine dikkat edilmelidir.

Patates için: Estival SC 400 patates bitkisinin ekiminden önce, keseksiz iyi hazırlanmış toprağın yüzeyine satılmalı uygulanması şeklinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra toprak diskaro aleti ile karıştırıldıktan hemen sonra patatesler ekilmelidir.

KALİBRASYON:

Damlama sisteminin kalibrasyonu, baştan ve sondan 3'er meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10'u geçmemelidir. Birim alana verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.



Estival® sc 400

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2,7	Nematisit (Nematod ilacı)
-------	-------------	---------------------------

400 g/L Fluopyram

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL:114

İlaçlama Makinesinin Kalibrasyonu

İlaçlama makinesinin kalibrasyonu uygulama öncesinde yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek Karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynakları yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİ

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Domates (sera), biber (sera), hıyar (sera), kornişon (sera) için iki uygulama yapılması gerekmektedir.

1. uygulama (60 ml/da dozda) fide şaşırtıldıktan 1 gün sonra,
 2. uygulama (60 ml/da dozda) ise ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
- Önerilen uygulama sayısını (2 uygulama) aşmayınız.

Patateste Kök-ur nematodlarına'na karşı ekim öncesi 120 ml/da doz bir defada uygulanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Estival SC 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C2,7** olarak sınıflandırılmış bir nematisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Estival SC 400'ün** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C2,7 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Topraktan uygulanan bitki koruma ürünleri ile karıştırılmak istenirse uygulama öncesi bir karışım ve fitotoksiste testi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ

Agrobrest Grup Tar.İl.ToH.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71
www.agrobrestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobrest Grup Tar.İl.ToH.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA
Tel: 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71
www.agrobrestgrup.com

