

Eurogold®

110 g/l Etoazole

Üst Düzey KORUMA



Bitkiler Korumamız Altında

agrobest®
GRUP

SC (Süspansiyon Konsantre)
110 g/l Etoxazole

Eurogold®

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su yumurta, larva, nimf	7 gün
ELMA	Avrupa Kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)		14 gün
ŞEFTALİ	İki Noktali Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)		3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



İki noktali kırmızıörümcek
(*Tetranychus urticae*)



Avrupa Kırmızıörümceği
(*Panonychus ulmi*)



İki Noktali Kırmızıörümcek
(*Tetranychus urticae*)

EUROGOLD® kontakt etkili bir akarısittir. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem deęiřtirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki devamlılıęı 1 ay civarındadır.

Baę: Yapılan sayımlarda yaprak başına ortalama 5-8 canlı birey olduęunda uygulama yapılır.

Elma: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüęünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapmak gerekir. Kontroller ilk ilaçlamadan sonra 15'er gün aralıklarla Ağustos sonuna kadar sürdürülmeli ve yoęunluk görüldüęü takdirde ilaçlama yapılmalıdır.

Karışabilirlik Durumu: Kuvvetli alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz. Dięer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

! *Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.

*Kullanmadan önce mutlaka ürün etiket bilgilerini okuyunuz.

www.agrobestgrup.com

agrobest®
GRUP

