

# Fullybut® 600

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	F <sub>3</sub> 13	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-------------------	-----------------------------

600 g/L Aclonifen

- Önce Etiketini Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 15 Gün İnsan ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin Tavsiye Edildiği Şekilde, Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

## TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi Üç Sefer Tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde;** Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Hemen tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde;** Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağzından bir şey vermeyin. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Tıbbi yardım alın.

**Cilt ile teması halinde;** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın.

**Göz ile teması halinde;** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

### ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanır ve belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası: (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 23.09.2020/11701

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
<b>AYÇİÇEĞİ (Çıkış öncesi)</b>	Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken-Iştır ( <i>Chenopodium album</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Serçedili ( <i>Stellaria media</i> ) Yavşanotu ( <i>Veronica hederifolia</i> )	Geniş yapraklı yabancı otlarda: <b>200 ml/da</b>  Darıcan otuna: <b>300 ml/da</b>  Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
<b>AYÇİÇEĞİ (Çıkış sonrası)</b>	Sirken-Iştır ( <i>Chenopodium album</i> ) Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	<b>125 ml/da</b> Çıkış sonrası yabancı otların 4-5 gerçek yapraklı döneminde	49 gün
<b>HAVUÇ</b>	Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken-Iştır ( <i>Chenopodium album</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleraceae</i> ) Yeşil Kirpidarı ( <i>Setaria viridis</i> ) Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Eşek Marulu ( <i>Sonchus arvensis</i> )	<b>150 ml/da</b> Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Aclonifen, Su

### ZARARLILIK İŞARETLERİ



### UYARI KELİMESİ: DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**EUH208** Alerjik reaksiyona yol açabilir.

### ÖNLEM İFADELERİ (H)

**P103** Kullanmadan önce etiketi okuyun.

**P220** Kıyafetlerden uzak tutun.

**P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

**P352** Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P401** Ulusal yönetmeliklere göre depolayın.

**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- **Nohut'un ve mercimeğin çiçeklenme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.**

NOHUT	Sirken-Iştır ( <i>Chenopodium album</i> ) Dilkanatan ( <i>Galium aparine</i> ) Sarmaşık Çoban Değneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) Küçük Turp ( <i>Rapistrum rugrosum</i> ) Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	<b>125 ml/da</b> Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	49 gün
	Dikenli Yabani Marul ( <i>Lactuca serriola</i> )	<b>75 ml/da</b> Çıkış sonrası yabancı otların 2- 4 gerçek yaprak döneminde	
MERCİMEK (Çıkış öncesi)	Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Gönül Hardalı ( <i>Myagrum perfoliatum</i> )	<b>250 ml/da</b> <b>300 ml/da</b> Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
MERCİMEK (Çıkış sonrası)	Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	<b>125 ml/da</b> Çıkış sonrası yabancı otların 2- 4 gerçek yaprak döneminde	49 gün
	Gönül Hardalı ( <i>Myagrum perfoliatum</i> ) Sarmaşık Çoban Değneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	<b>150 ml/da</b> Çıkış sonrası yabancı otların 2- 4 gerçek yaprak döneminde	

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

## Fullybut® 600

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	<b>F<sub>3</sub> 13</b>	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-------------------------	-----------------------------

600 g/L Aclonifen

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

**ÜRETİCİ FİRMA**

Agrobrest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobrestgrup.com

## Fullybut® 600

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	F <sub>3</sub> 13	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-------------------	-----------------------------

600 g/L Aclonifen

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çıkış öncesi uygulamalarda toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Bunun için toprak iyi işlenmiş, keseksiz olmalı ve dekara 20-50 litre su kullanılmalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda kültür bitkisinde kısa süreli ve geçici hafif sararma görülebilir. Uygulamalar mercimeğin çiçeklenme başlangıcından önce bitirilmelidir.

### DİRENÇ YÖNETİMİ:

**Fullybut 600** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup F<sub>3</sub> 13** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Fullybut 600** 'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup F<sub>3</sub> 13** hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA

ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

### ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com