

Inplanner®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	23	6	İnsektisit + Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
-------	----	---	--

228.6 g/L Spiromesifen + 11.4 g/L Abamectin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 12 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR!

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görmeye neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde; Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Dinlenme, sıcaklık ve temiz hava sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Ağızı hemen çalkalayın ve temiz havaya çıkarın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Kusturmaya çalışmayın.

Cilt ile teması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Hemen bol suyla yıkayın ve kirlenmiş giysileri çıkarın. Ambulans çağırın. Bu talimatları yanınıza alarak hastaneye gidin ve yolda su dökmeye devam edin. Hemen tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.

Göz ile teması halinde; Hemen üzerine en az 15 dakika devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tahriş devam ederse su akıtmaya devam edin ve bu talimatları yanınıza alarak hastaneye götürün. Hemen tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamuk- Pamuk kırmızıörümceği ve İki noktalı kırmızı örümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için, bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra surveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında veya içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Tarla kenarından tarlanın içine yayılmış ve yapılan surveyde de yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet İki noktalı kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılır. Yaprak altlarının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ: İNPLANNER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 23 ve 6** olarak sınıflandırılmış bir insektisit + akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **İNPLANNER** 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 23 ve 6 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Gün, Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası :

Ruhsat tarihi ve numarası :

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre	
PAMUK	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/da (Yumurta, Larva, Nimf, Ergin)	21 gün
PAMUK	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	35 ml/da (Yumurta, Larva, Nimf, Ergin)	21 gün

Inplanner[®]

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	23	6	İnsektisit + Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek ilacı)
-------	----	---	--

228.6 g/L Spiromesifen + 11.4 g/L Abamectin

