

Kavala®



IMI Toleranslı KANOLA ve
IMI Plus (Clearfield Plus)
AYÇİÇEĞİ yetiştiriciliğinde
Yabancı Ot Sorununa
DOĞRU ÇÖZÜM



Bitkiler Korumamız Altında

agrobest®
GRUP

25 g/l Imazamox
SL - Suda Çözünebilir Konsantr

Kavala®



AYÇİÇEĞİ



Kırmızı köklü tilkikuyruğu (*Amaranthus retroflexus*)
Sirken (*Chenopodium album*)
Şeytan elması (*Datura stromonium*)
Çatal otu (*Digitaria sanguinalis*)
Darıcan (*Echinochloa crus-galli*)
Yapışkan ot (*Setaria verticillata*)
Yeşil kirpi darı (*Setaria viridis*)
Köpek üzümü (*Solanum nigrum*)

KANOLA

Yabani hardal (*Sinapis arvensis*)
Yavşan otu (*Veronica cymbalaria*)
Uzun süpürge otu (*Descurainia sophia*)
Gelincik (*Papaver rhoeas*)



200 ml/da
Ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde

200 ml/da
Kanolanın 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-6 yapraklı dönemlerinde



Kavala® NEDİR?

IMI Toleranslı KANOLA ve IMI Plus Toleranslı (Clearfield Plus) AYÇİÇEĞİ çeşitlerinde verim kaybına yol açan yabancı otların kontrolünde kullanılan sistemik bir herbisittir. Kavala® çıkış yapmış yabancı otların yapraklarından nüfuz ederek köklerine kadar ulaşır, yabancı otların su alımını durdurarak kontrol altına alınmalarını sağlar. Kavala®'nın etkisi 2 gün içerisinde görülmeye başlar, 7-9 gün arasında sonuca ulaşılır.



Sirken
(*Chenopodium album*)



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)



Yabani hardal
(*Sinapis arvensis*)



Köpek üzümü
(*Solanum nigrum*)

NEDEN Kavala® ?



MÜKEMMEL YABANCI OT KONTROLÜ



SİSTEMİK ETKİ MEKANİZMASI



GÜÇLÜ VE ETKİLİ PROFESYONEL ÇÖZÜM



IMI ÇEŞİTLERDE GÜVENİLİR YÖNTEM

BİTKİLERDE Kavala® ?

Ayçiçeği: Uygulama ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve uygulama anında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünü, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10°C'nin üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.

Kanola: Uygulama kanolanın 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-6 yapraklı dönemlerinde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve uygulama anında memeler kanola bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-25 litre su kullanılması idealdir. Bitki koruma ürünü, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz.

Karışılabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır.

! *Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
*Kullanmadan önce mutlaka ürün etiket bilgilerinizi okuyunuz.

