

Maddog®70 WP

Suda Islanabilir Toz (WP)

Grubu	C _{1,5}	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------------------	-----------------------------

% 70 Metamitron

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 10.05.2022/12337

KULLANILACAK İTİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre	
ŞEKER PANCARI	Ballıbaba (<i>Lamium</i> sp.) Adi Yavşan Otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Papatya (<i>Matricaria</i> spp.) Kazayağı – Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Horoz İbici (<i>Amaranthus</i> spp.) Tavşan bıyığı = Salkım otu (<i>Poa annua</i>) Yabani Semizotu (<i>Portulaca</i> sp.) Yabani Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	500-700 g/da Çıkış öncesi	-
	Fare Kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yabani Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Adi Yavşan Otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Karapazı (<i>Atriplex patula</i>) Kazayağı – Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	600 g/da Çıkış sonrası (Kotiledon ve 2-4 yapraklı dönemde)	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Maddog 70 WP ile ilaçlama yaparken ilacın diğer ürünlere sürüklenmemesine dikkat edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Maddog 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C_{1,5}** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Maddog 70 WP'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C_{2,5} harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

- Önce Etiket Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin Tavsiye Edildiği Şekilde, Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın.

Ciltle teması halinde, kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi sabun ve su ile yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa, derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde, kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Maddog® 70 WP

Suda Islanabilir Toz (WP)

Grubu	C _{1,5}	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------------------	-----------------------------

% 70 Metamitron

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

