

# Maksiyer®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A	HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
-------	---	----------------------------

45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)

- Önce Etiketini Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyiçe Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

İnsanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

İmal Tarihi:  
Son kullanma tarihi :  
Şarj numarası :  
Ruhsatname tarihi ve numarası: 24.02.2014/9512

**KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki adı	Yabancı ot adı	Uygulama Dozu
BUĞDAY	Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )	90 ml/da
	Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) Kuş yemi ( <i>Phalaris paradoxa</i> ) İngiliz çimi ( <i>Lolium perenne</i> )	100 ml/da
	ARPA	Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )

\*Yulafta kullanılmamalıdır.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

**Kalibrasyon:**

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

**Uygulamaya Hazırlama:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptaki su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**MAKSİYER**, tüm buğday çeşitleri ile yazlık ve kışık arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otları kontrol eden yeni aktif maddeli bir bitki koruma ürünüdür. Hububatın 2 gerçek yaprak döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım aralığı vardır. İçeriğinde yayıcı yapıştırıcı olduğundan ek bir yayıcı-yapıştırıcı gerekmez.

Net miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

**İçindekiler:** Pinoxaden, cloquintocet-mexyl, Solvesso 100

**Zararlılık işaretleri**



**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE**

**Zararlılık ifadeleri (H)**

<b>H226</b>	Alevlenir sıvı ve buhar.
<b>H317</b>	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
<b>H318</b>	Ciddi göz hasarına yol açar.
<b>H335</b>	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
<b>H336</b>	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
<b>H411</b>	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**Önlem ifadeleri (P)**

<b>P271</b>	Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
<b>P273</b>	Çevreye verilmesinden kaçının.
<b>P280</b>	Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
<b>P305+</b>	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 15 dakika dikkatlice durulayın.
<b>P351+</b>	Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
<b>P338</b>	
<b>P501</b>	İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
<b>EUH401</b>	İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

# Maksiyer®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	---	----------------------------

45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)

## İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde;** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın.

**Yutulması halinde;** Hemen tıbbi yardım alın. Ağız suyuyla iyice çalkalayın.

**Cilt ile teması halinde;** Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Ağrı yok olana kadar bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Göz ile teması halinde;** Bakınız önlem ifadeleri P305+ P351+ P338,

## ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

**Uygulamalar** günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**Uygulama Dönemi:** Buğday ve Arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir.

**Uygulama Tekniği:** Kuraklık, don, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi bitkilerin stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleneneğinden bu koşulların varlığı durumlarında uygulamadan kaçınılmalıdır. **MAKSİYER** uygulamadan bir saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi olmadığı gibi biyolojik etkinliğinde toprak tipi ve organik madde içeriğinin önemi yoktur.

**Bitki Tahammülü:** Önerildiği şekilde kullanıldığında **MAKSİYER**, tavsiye edildiği buğday, arpa bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** **MAKSİYER** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup A** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **MAKSİYER 'in** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup A harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** **MAKSİYER**, bitki koruma ürünlerinin birçoğu ile uygulama zamanı doğru olmak kaydı ile tank karışımı şeklinde karıştırılabilir. Karışıma girecek bitki koruma ürünleri uygulama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli, karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalı, **MAKSİYER** önce uygulanmış ise hormon içerikli herbisitler 7 gün sonra, hormon içerikli herbisitler önce uygulanmış ise **MAKSİYER** 21 gün sonra uygulanmalıdır.

## KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Artan karışımı kuyu, havuz, çeşme yalaklarına ve akarsulara dökmeyiniz.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

## DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

## RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.

Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com