

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATI-EDDHA
MAXİFER

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)	% 6

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH aralığı Demir (Fe): 2-11

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

KÜLTÜR BİTKİLERİ	KULLANIM DOZU AĞAÇ BAŞINA TOPRAKTAN UYGULAMA
YENİ DİKİLEN AĞAÇLARDA	20-50 g
MEYVE TUTUMUNA YAKIN	50-75 g
VERİM DÖNEMİNDE	100-200 g
BÜYÜK AĞAÇLARDA (ŞEFTALİ, NEKTARİN)	200 g
BÜYÜK AĞAÇLARDA (ELMA, ARMUT)	300 g
BÜYÜK AĞAÇLARDA (NARENCİYEGİLLER)	250 g
BÜYÜK AĞAÇLARDA (KAYISI, ERİK)	200 g
BAĞ (ASMA BAŞINA)	20 g
ANTEP FISTIĞI	200 g
SEBZELER (AÇIK ALAN VE SERALARDA)	750 g/da Damlama Sulama
ÇİLEK (AÇIK ALAN VE SERALARDA)	250 g/da Damlama Sulama
KARPUZ, KAVUN	500 g/da Damlama Sulama
KESME ÇİÇEKÇİLİK	250 g/da Damlama Sulama

KULLANIM ŞEKLİ

a) Sebzeler, Çilek, Karpuz ve Kavun: Fideler dikildikten sonra damlama sulama ile uygulanır. Damlama sulama sistemi öncelikle 5-10 dakika sadece su ile çalıştırılır. Daha sonra önerilen miktardaki **MAXİFER** 10 dakika içinde seraya verilir. Arkasından 5 dakika daha damlama sulama sistemi su ile çalıştırılır. Böylece ürünün damlama sulama sisteminde kalması engellenmiş olur. Sararma çok yüksek miktarda ise, bu uygulama 21 gün ara ile tekrar edilir.

b) Taş ve Yumuşak Çekirdekli Ağaçlar: Ağaç başına önerilen miktardaki **MAXİFER** yağıştan veya sulamadan hemen önce köklerin bulunduğu bölgeye (yaprak izdüşümü) homojen bir şekilde serpilir. Damlama sulama olan ağaçlarda dönüm başına olan ağaç miktarı ile uygulama dozu çarpılır ve damlama sulama sisteminin sulayacağı alana göre dekar hesabı ile topraktan verilir.

ÖNEMLİ NOT: EDDHA Demir şelatı topraktan alınabildiği için üstten uygulama yapılmaz. Bu yüzden **MAXİFER** sadece ve sadece topraktan kullanılmalıdır.

KARİŞİBİLİRLİK: **MAXİFER %6** normalde tek başına uygulanır. Diğer toz ve sıvı gübreler ve ilaçlar ile karışabilir. Asit ve çok alkali ürünlerle karıştırmayınız.

UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız

Uygulama esnasında sigara içmeyiniz ve herhangi bir şey yemeyiniz.

Uygulama sırasında ilacın tavsiye edilmediği bitkilere bulaşmasına mani olunuz.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.



FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık: 0.25-0.5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 kg

İTHALATÇI FİRMA: AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOH. İML. İTH. İHR. SAN VE TİC A.Ş.

ADRES: KEMALPAŞA OSB MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. 61 KEMALPAŞA/İZMİR

TEL: 0 (232) 877 17 70 **FAX:** 0 (232) 877 17 71

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.