

# Nemasat® 400 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	1 B	Nematisit (Nematod ilacı)
-------	-----	---------------------------

400 g/l Fenamiphos

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

## TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kramp, karın ağrısı, göz bebeklerinin büzülmesi, nefes almada zorluklar ve terleme.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde:** Tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

**Yutulması halinde:** Hemen tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Ağız suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su için. Tıbbi yardım alın.

**Cilt ile teması halinde:** Hemen tıbbi yardım alın. Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde:** Hemen tıbbi yardım alın. Gözlerinizi ovmayın. Hemen bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

### ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

2 mg. Atropin damara zerk edilir. Şiddetli zehirlenmelerde dozaj 4 mg'a çıkartılır. 10-15 dakikada bir hasta iyileşinceye kadar 2 mg. olarak tekrarlanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114**

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 06.06.2005/5126

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
MUZ	Kök ur nematodları ( <i>Meloidogyne spp.</i> )	7,5 l/da	60 gün
	Spiral nematod ( <i>Helicotylenchus multincinctus</i> )	7,5 l/da	60 gün
TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE	Turunçgil nematodu( <i>Helicotylenchus semipenetrans</i> )	7,5 l/da	60 gün
TURUNÇGİL FİDANLIKLARINDA	Turunçgil nematodu( <i>Helicotylenchus semipenetrans</i> )	5 l/da	--
TURUNÇGİL FİDANLARI	Turunçgil nematodu ( <i>Helicotylenchus semipenetrans</i> )	200 ml/100 l su bandırma	--
DOMATES	Domates Kök ur nematodları ( <i>Meloidogyne spp.</i> )	2,5 l/da	90 gün veya dikim öncesi

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fenamiphos, Ksilen



TEHLİKE

### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226** Alevlenir sıvı ve buhar.  
**H300** Yutulması halinde öldürücüdür.  
**H311** Cilt ile teması halinde toksiktir.  
**H315** Cilt tahrişine yol açar.  
**H318** Ciddi göz hasarına yol açar.  
**H332** Solunması halinde zararlıdır.  
**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261** Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.  
**P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
**P303+** DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın.  
**P353**  
**P304+** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve olay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.  
**P340** GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.  
**P305+** Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
**P338**  
**P370+** Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.  
**P378**  
**P501** içeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

# Nemasat® 400 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	1 B	Nematisit (Nematod ilacı)
-------	-----	---------------------------

400 g/l Fenamiphos

## İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**MUZ Bahçeleri:** Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır.

Uygulamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

### İlaçlamalar:

1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
2. İlk muz tırağının oluştuğu devrede
3. Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, **Nemasat 400 EC** uygulamalarda yalnızca birinde kullanılmalı, diğer uygulamalar ruhsatlı diğer nematod BKÜ'leri ile yapılmalıdır.

## TURUNÇGİL Bahçeleri:

Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek bitki koruma ürünü miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilk baharda yapılmalıdır.

### TURUNÇGİL Fidanlıkları:

Gerekli miktar bitki koruma ürünü süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan karışıma, 30 dakika süre ile bandırılır.

### DOMATES:

-Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek bitki koruma ürünü miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak bitki koruma ürününün 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

## DİRENÇ YÖNETİMİ

**Nemasat 400 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 1 B** olarak sınıflandırılmış bir Nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Nemasat 400 EC'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 1 B harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kuşlara zehirlidir.
- Yeraltı suları ve içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayınız.
- Sirt pülverizatörü ile uygulamayınız.

## DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

## RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.ToH.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com