

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Hıyar (Örtü altı)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae.</i>)	250 ml / da Larva, Nimf, Ergin
Çilek	Kırmızı Örümcek (Pamuk kırmızı örümceği: <i>Tetranychus cinnabarinus</i> ; İki noktalı kırmızı örümcek: <i>Tetranychus urticae</i>)	250 ml / da Larva, Nimf, Ergin
Domates (Örtü altı)	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae, T. cinnabarinus</i>)	250 ml / da Larva, Nimf, Ergin
Elma	Avrupa Kırmızı Örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	250 ml / 100 l.su Larva, Nimf, Ergin
Patlıcan (Örtü altı)	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae, T. cinnabarinus</i>)	250 ml / da Larva, Nimf, Ergin

UYGULAMA SIKLIĞI:

Priority uygulamasına, şartlar değişmedikçe 7-10 gün ara ile kullanmaya devam ediniz

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Bitki için uygun dozda ilaç, gerekli miktarda su ile ayrı bir kapta karıştırılıp, kısmen su dolu olan aletin deposuna yavaş ve sürekli bir şekilde karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

KULLANIM ŞEKLİ:

İlaçlama bitkilerin gövde, yaprak ve dallarında kuru bir yer kalmayacak şekilde eşit olarak pülverize yapılmalıdır. Sıcak saatlerde, rüzgarlı havalarda, bitkilerin yaprakları çok kuru ve solgun olduğunda ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH'sı 4,5 – 8,5 arasında olmalıdır

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.



PRIORITY

Formülasyon şekli: Sıvı formülasyon (SL)

Grubu	BİYOLOJİK İNSEKTİSİT/ AKARİSİT (Böcek ve Kırmızı örümcek ilacı)
-------	---

Aktif maddenin adı ve miktarı: *Paecilomyces fumosoroseus strain PFs-1* %1.5 , 1x10⁸ kob/ml min.

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. -EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yutulursa ve/veya solunursa mide bulantısı, mide rahatsızlıkları görülebilir. Cilt ve göz ile temas durumunda hafif tahriş görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ : Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alın. Doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün. Yutulması halinde hastayı kusturmayın, derhal tıbbi yardım isteyin. Hasta kendinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Solunma durumunda açık havaya çıkın. Gerekirse yapay solunum yapın. Cilt ile temas durumunda ilaçla bulaşık giysileri çıkarın ve cildi 15-20 dakika bol sabun ve su ile yıkayın. Göz ile temas durumunda ise en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER :Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

Tehlike özelliği: Sınıflandırılmamıştır.

Tehlike sembolü:
Sınıflandırılmamıştır.

İçindekiler:
Paecilomyces fumosoroseus PFs-1

Uygulayıcı ve Çevre İle İlgili Risk İbaresini ve Açıklaması:
Sınıflandırılmamıştır.

Güvenlik İbaresini ve Açıklaması:
Sınıflandırılmamıştır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR :

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

DEPOLAMA DURUMU VE RAF ÖMRÜ:

Normal (serin ve kuru) şartlarda altında orijinal ambalajında ağız kapalı olarak depolanmalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

AGROBESTGRUP Tar.İl.Toh.İm.İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak- Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 8771770 Fax:0 232 8771771

İMALATÇI FİRMA

T.STANES AND COMPANY LIMITED

8/23-24 Race Course Road, Coimbatore 641 018 – Hindistan Tel: 91-422-2221514 , 2223515 , 2223518, Faks: 91-422-217857 , 217432

Hıyar, Domates (Kırmızı örümcek): Bitkilerin çiçeklenme döneminde, tarlaya köşegenlerinden girilerek 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında, kırmızı örümcek nimf ve erginleri sayılır. Dekar başına 10 bitki incelenir. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğuunda ilaçlama yapılır. Gerektiğinde ilaçlama tekrarlanır.

Patlıcan (Kırmızı örümcek): Serayı temsil edecek şekilde tesadüfen kontrol edilen 40 bitkinin alt, orta ve üst kısımlarından birer yaprakta yapılan sayımlar sonucunda yaprak başına 10'un üzerinde canlı birey (larva, nimf, ergin) bulunduğuunda ilaçlama yapılır. Gerektiğinde ilaçlama tekrarlanır.

Çiçek (Kırmızı örümcek: *T. cinnabarinus*, *T.urticae*): Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çiçek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görünmeden önce) kırmızı örümcek görüldüğünde bir ilaçlama yapılır.

Mevsim içi uygulaması: Yapraklar, mart sonu-nisan başından itibaren 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir ve yaprakçık başına 15 kırmızı örümcek (nimf+ergin) bulunduğuunda ilaçlama yapılır. Gerektiğinde ilaçlama tekrarlanır.

Elma: Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, Avrupa kırmızı örümceği sayısının yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapmak gerekir. Gerektiğinde ilaçlama tekrarlanır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Paecilomyces fumosoroseus fungusunun sporları, insektlerin üst derileri ile temasa girdiklerinde buradan direkt olarak vücutlarının içine girerek gelişmeye başlarlar. Büyüyüp çoğalarak insektlerin vücudunu tamamen kaplarlar ve sonunda ölmelerini sağlarlar. Fungus, insekte temas yolu ile bulaştığından dolayı insekte hastalığa sebep olması için insekt tarafından tüketilmesine/yenmesine gerek yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Priority adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre ***Paecilomyces fumosoroseus*** olarak sınıflandırılmış bir biyolojik isektisit/akarisit. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Priority 'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup *Paecilomyces fumosoroseus* harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Priority'yi fungusitler ile karıştırmayın. **Priority** uygulaması ile bir fungusit uygulaması arasında en az 7-10 gün beklenmesi tavsiye edilir.

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.



PRIORITY

Formülasyon şekli: Sıvı formülasyon (SL)

Grubu	BİYOLOJİK İNSEKTİSİT/AKARİSİT (Böcek ve Kırmızı örümcek ilacı)
-------	--

Aktif maddenin adı ve miktarı: *Paecilomyces fumosoroseus strain PFS-1* %1.5 , 1x10⁸ kob/ml min.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

AGROBESTGRUP Tar.İl.Toh.İm.İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 8771770 Fax:0 232 8771771

İMALATÇI FİRMA

T.STANES AND COMPANY LIMITED

8/23-24 Race Course Road
Coimbatore 641 018 – Hindistan
Tel: 91-422-2221514 , 2223515 , 2223518
Faks: 91-422-217857 , 217432