

Saf-T- Side®

Yazlık yağ (-)

Grubu	UN	İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
700 g/L Mineral Yağ		

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Yutulması halinde: Hemen tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Ağrı yok olana kadar bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. Yıkamaya devam edin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 19.12.2000/3875

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI

ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
ARMUT	Virgül kabuklubiti (<i>Lepidosphes ulmi</i>)	1500 ml/100 L su
BAĞ*	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	1000 ml/100 L su
DOMATES (sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1250 ml/100 L su
KAYISI	Erik koşnili (<i>Sphaerolectanium prunastri</i>)	1500 ml/100 L su
KİRAZ	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	1000 ml/100 L su
PAMUK	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	400 ml/da
ŞEFTALİ	Şeftali virgül kabuklubiti (<i>Mercetaspis halli</i>)	1500 ml/100 L su
	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	1000 ml/100 L su
ZEYTİN	Zeytin pamuklukoşnili (<i>Filippia oleae</i>)	1500 ml/100 L su
	Zeytin kabuklubiti (<i>Parlatoria oleae</i>)	1500 ml/100 L su
	Zeytin karakoşnili (<i>Saissetia oleae</i>)	1500 ml/100 L su
	Zeytin yarakoşnili (<i>Pollinia pollini</i>)	1500 ml/100 L su

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Mineral Yağ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H332 Solunması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261** Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
- P271** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P304+P340** Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P312** Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
- P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Uygulama öncesi, BKÜ kabı sallanarak, BKÜ'nün iyice karıştırılması sağlanmalıdır. Ambalajın kapağı açıldığında, BKÜ'nün üzerinde ayrılmış yağ tabakası görülürse iyice çalkalanarak karıştırılmalı ve 24 saat bekletildikten sonra yağ ayrışması görülen BKÜ'ler kullanılmamalıdır.
- Yazlık yağ tatbikatından 2 ay önce ve 2 ay sonrasında kadar olan süre içinde Folpet ve Captan etkili maddeli BKÜ'ler kullanılmamalıdır.
- Kükürtlü BKÜ'ler ile birlikte veya kükürtlü BKÜ'lerin tatbikatından 3 hafta sonrasında kadar uygulama yapılamaz.
- Çok düşük sıcaklıkta (4 C°nin altında) ve yüksek sıcaklıkta (32 C°nin üzerinde) uygulama yapılmamalıdır.

Saf-T- Side®

Yazlık yağ (-)

Grubu	UN	İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
-------	----	--

700 g/L Mineral Yağ

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armutta Virgül Kabuklubitine Karşı; Birinci ve ikinci dölle karşı yapılacak yaz ilaçlamalarına karar vermek için, ilkbaharda ve temmuz başlarında yumurta açılımından önce kontrol yapılır ve 5 cm uzunluğunda bir dalda, altında canlı yumurta bulunan en az 5 adet dişi kabuğu bulunuyorsa, yumurta açılımından en geç 7-10 gün sonra en yüksek larva çıkışında ilaçlama yapılmalıdır.

Bağda Turuncgöl Unlubitine Karşı; mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Domateste Beyazsinek; beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Kayıda Erik Koşniline Karşı, kış mücadelesi yapılmadığı veya yeterli olmadığı takdirde, kışık nimfler ergin döneme geçmeden önce (mart sonu nisan başı) yazlık bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmalıdır. Bu dönemde de ilaçlama yapılmamış ise ilk nimf çıkışları takip edilerek, ilk çıkışlardan 10-15 gün sonra veya hareketli nimflerin çıkış oranı %60'a ulaştığında ilaçlama yapılmalıdır.

Kirazda Dut Kabuklubitine Karşı; ilaçlama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı kiraz çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Pamuk, İki Noktalı Kırmızıörümcek; Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı iki noktalı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide Şeftali Virgül Kabuklubitine Karşı; nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftalide Dut Kabuklubitine Karşı; ilaçlama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir sulara bulaştırmayınız.
- Ağaçlar solgun durumda iken, önce sulama yapılmalı daha sonra uygulama yapılmalıdır.
- BKÜ çok soğuk (4 C°'nin altında) ve çok sıcak ve sıcaklığın çabuk değiştiği yerlerde depolanmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA

BRANDT Consolidated Inc.

2935 South Koke Mill Road, Springfield,
Illinois 62677 / ABD

ÜRETİM TESİSİ

BRANDT Consolidated Inc.

211 W. Route 125 Box 350 Pleasant Plains,
Illinois 62677 / ABD

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com

Saf-T- Side®

Yazlık yağ (-)

Grubu	UN	İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
-------	----	--

700 g/L Mineral Yağ

uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytinde Zeytin PamukluKoşniline Karşı; zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde Zeytin Kabuklubitine Karşı; yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50'sinin açıldığı (ikinci döl erginlerinin %70-80'i bulunduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde Zeytin Karakoşniline Karşı; yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci, %90'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde Zeytin Yara Koşniline Karşı; zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SAF-T-SIDE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup UN** olarak sınıflandırılmış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SAF-T-SIDE**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup UN harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kesinlikle kükürt içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÜRETİCİ FİRMA

BRANDT Consolidated Inc.
2935 South Koke Mill Road, Springfield,
Illinois 62677 / ABD

ÜRETİM TESİSİ

BRANDT Consolidated Inc.
211 W. Route 125 Box 350 Pleasant Plains,
Illinois 62677 / ABD

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com