

**Saury®**

Akıllı Seçim  
**Yüksek Koruma**


*Bitkiler Korumamız Altında*

**agrobest®**  
GRUP



Süspansiyon Konsantre (SC)  
125 g/l Bifenazate + 7,5 g/l Abamectin

**Saury®**

 DOMATES (sera)	BİBER (sera)	KARANFİL (sera) (kesme çiçek)
 Kırmızı örümcekler ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus urticae</i> )	Kırmızı örümcekler ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus urticae</i> )	Süs bitkilerinde kırmızı örümcekler ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus urticae</i> )
 100 ml / 100 L. su (larva, nimf, ergin)	100 ml / 100 L. su (larva, nimf, ergin)	100 ml / 100 L. su (larva, nimf, ergin)
 3 gün	3 gün	3 gün



**Kırmızı örümcekler**  
(*Tetranychus cinnabarinus*, *Tetranychus urticae*)

## Saury® ETKİ ŞEKLİ

Kırmızı örümceklerin sinir sistemini bozarak hiperaktiviteye (sürekli hızlı hareketlilik) neden olur. BKÜ ile temas eden kırmızı örümceklerin beslenmesi 3 saat içerisinde durur. Ölüm 3-4'üncü günde görülmeye başlanır.



### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Bordo bulamacı, kükürt ve yazlık yağ ile karışmaz.

- \*Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
- \*Kullanmadan önce mutlaka ürün etiket bilgilerini okuyunuz.

## HASTALIKLARA KARŞI ETKİ

-  Mükemmel Kombinasyon
-  Seçici etki
-  Hızlı sonuç