

Solemnity®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

- Önce Etiket Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde, tıbbi yardım alın, maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın.
Yutulması halinde, hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Ağzı su ile çalkalayın. Bol miktarda su için.
Cilt ile teması halinde, kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde, hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tıbbi yardım alın. Gözlerinizi ovmayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:08.05.2017 /10879

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
ANTEPFİSTİĞİ	Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	50 g/100 L su	-
ARMUT	Kara leke (<i>Venturia pirina</i>)	30 g/100 L su	7 gün
	Armut memeli pası (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	40 g/100 L su	14 gün
AYVA	Monilya (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	50 g/100 L su	14 gün
ELMA	Külleme (<i>Podospaera leucotricha</i>)	40 g/100 L su	14 gün
	Kara leke (<i>Venturia inaequalis</i>)	30 g/100 L su	7 gün
KAYISI	Çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
MANDARİN	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata</i> f.sp <i>citri</i>)	40 g/100 L su	7 gün
NAR	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	50 g/100 L su	-
NOHUT	Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>)	50 g/da	10 gün
ŞEFTALİ	Çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 l su	14 gün
VİŞNE-KIRAZ	Çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 l su	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilacli su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilacli su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Boscalid, Pyraclostrobin, Kaolen

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302 + Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.

H332

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.

P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

P351 + P338 Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Solemnity®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürününün özellikleri: Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir bitki koruma ürünü olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

Antepfistiğinde karazenk:

1. uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllemeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.
2. uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut memelipası:

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan önce,
2.uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90'ı döküldüğü zaman.
Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi (12-14 gün) dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Ayva monilya:

1. uygulama: Çiçeklerin %5'i açtığı dönemde,
2. uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında,
3. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Solemnity®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

Elma küllemesi:

- uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
- uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğü dönemde,
- ve diğer uygulamalar:** Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kayısı-Şeftali-Vişne-Kiraz çiçek monilyası:

- uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
- uygulama:** Tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.

Şeftali ve Kayısı'da sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası:

- ilaçlama; Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),
- ilaçlama; Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Mandarin kahverengi leke hastalığı:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması için 14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Narda kahverengi leke:

- uygulama:** Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.
- uygulama:** Taç yapraklar döküldüğünde.
- uygulama:** Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Nohut antraknozu: Uygulamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır. Hastalık şiddeti ve iklim koşulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Solemnity adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup C2:7 ve C3:11** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Solemnity'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C2:7 ve C3:11** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden önce kullanılması tavsiye edilir.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com