

Surrender® 5 SG

%5 Emamectin benzoate

Fark Yaratan
KORUMA



Bitkiler Korumamız Altında

agrobest®
GRUP

Surrender® 5 SG

SG (Suda Eriyebilir Granül)
%5 Emamectin benzoate

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
DOMATES (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 l su larva	7 gün
BİBER (Sera)	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/da larva	
HIYAR (Sera)		30 g/100 l su larva	
PATLICAN (Sera)			



Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidopter larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. **Surrender 5 SG** güçlü bir mide zehiri olup kontakt etkiye de sahiptir.

Domates Yeşilkurt: Seranın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Biber, Hıyar ve Patlıcan Pamuk Yaprakkurdu: Serada 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından zamanına özen gösterilmelidir.

Karışabilirlik Durumu:

Surrender® 5 SG birçok standart insektisit, ve fungusit ile karıştırılabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

!Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
!Kullanmadan önce mutlaka ürün etiket bilgilerini okuyunuz.

