

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Suv-agri 360 SC 'den en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Su ile hemen karıştırdıktan her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Mide ve temas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir. Hedef dışı organizmalara zarar vermemek ve israfı engellemek için, zararlıların kültür bitkisinin dal ve yapraklarında birleşerek damla oluşturup akmayacak şekilde uygulama yapılması önerilir.

Bağ-Bağ salkım güvesi: Salkım güvesi'ne karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklıklar toplanının birinci dölde, larvaya etkili insektisit kullanılacaksa 120 gün-dereceye yaklaşması veya bu dereceyi bulması, yumurtaya etkili insektisit kullanılacaksa 95-100 gün-dereceye ulaşması, ikinci dölde larvaya etkili insektisit kullanılacaksa 520 gün-dereceye yaklaşması veya bu dereceyi bulması, yumurtaya etkili insektisit kullanılacaksa 450-460 gün-dereceye ulaşması, üçüncü dölde larvaya etkili insektisit kullanılacaksa 1047 gün-dereceye, yumurtaya etkili insektisit kullanılacaksa 970-980 gün-dereceye ulaşması ve bitki fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ve bağda ilk yumurta görülmeden ilaçlamaya karar verilir. Her dölde karşı bir ilaçlama yapılır.

Pamuk – Yeşilkurt:

Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu uygulama karar verilir.

Elma, Armut, Ayva -Elma içkurdu: Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her

Suv-agri® 360 sc

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	18	5	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	---	--------------------------

300 g/L Methoxyfenozide + 60 g/L Spinetoram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Gözde hafif tahrişe neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Burun ve ağzı su ile yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi gözlem altında tutun.

Yutulması halinde; Ağzı hemen çalkalayın ve temiz havaya çıkarın. Ağzı suyla iyice çalkalayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın. Kusturmaya çalışmayın.

Cilt ile teması halinde; Bol sabun ve su ile yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Kirlenmiş cildi hemen yıkayın ve üzerine su dökün. Giysinin içine geçmiş ise hemen çıkarın ve cildi suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarırken, kirlenmiş ciltle temas edilmesinden kaçınmaya dikkat edin.

Göz ile teması halinde; Hemen üzerine bol su akıtın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Bir ambulans çağırın ve bu talimatları yanınıza alıp su akıtmaya devam ederek hastaneye götürün. Hemen tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Solvessolmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
BAĞ*	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	30 ml/100 L su (Larva-yumurta)	7 gün
PAMUK	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	55 ml/da (Larva)	14 gün
ELMA	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	25 ml/100 L su (Larva-yumurta) 7 gün	
ARMUT	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	25 ml/100 L su (Larva)	7 gün
AYVA	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	25 ml/100 L su (Larva)	7 gün
DOMATES (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/da (Larva)	3 gün
BİBER (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/da (Larva)	3 gün
HIYAR (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/da (Larva)	3 gün
KORNIŞON (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/da (Larva)	3 gün

Suv-agri® 360 sc

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	18	5	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
300 g/L Methoxyfenozide + 60 g/L Spinetoram			

döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Ancak, bu mücadelede üründe % 2'ye kadar zarar göz ardı edilebilir. Bu nedenle, zararlıların popülasyon seviyelerinin bilinmesi ayrı bir önem taşır. Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ve yoğunluğun tespit edilmesinde tahmin ve uyarıdaki yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlere göre ilaçlamaya karar verdikten sonra birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli olmaktadır.

Elma- Elma içkurduna karşı ovisit (yumurta) uygulaması: İlk yumurta tespitinden sonra etkili sıcaklıklar 90 gün-dereceye ulaşmadan, larva çıkışlarından önce yapılmalıdır.

Domates, Biber, Hıyar ve Kornişion -Yeşilkurt: Domates, biber, hıyar ve kornişionda ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzak kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanına köşegenler doğrultusunda girilir, üretim alanının büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuşsa derhal mücadeleye geçilir. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Suv-agri 360 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 5 ve 18** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Suv-agri 360 SC'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 5 ve 18 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Suv-agri[®] 360 sc

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	18	5	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	-----------	----------	--------------------------

300 g/L **Methoxyfenozide** + 60 g/L **Spinetoram**

