

Tırpan®

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	G:9	F1:12	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-------	-----------------------------

250 g/l Glyphosate aside eşdeğer Glyphosate IPA tuzu + 40 g/l Diflufenican

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık, bulanık görme gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. Bol sabun ve su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Belirli bir antidotu bilinmemektedir. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel : 114

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu ve Dönemi	
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Dönbaba (<i>Erodium cicutarium</i>) Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kırmızı çiçekli ballıbaba (<i>Lamium purpureum</i>) İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Kamış (<i>Phragmites australis</i>) Ortanca sinirotu (<i>Plantago media</i>) Kıvırcık labada (<i>Rumex crispus</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>)	700 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır.	
	KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Koyungözü papatya (<i>Bellis perennis</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Japon bromu (<i>Bromus japonicus</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>) Saka dikenli (<i>Carduus pycnocephalus</i>) Topak boynuz otu (<i>Cerastium glomeratum</i>) Yabani havuç (<i>Daucus carota</i>) Hazeran (<i>Consolida anthoroidea</i>) Güneş sütleğini (<i>Euphorbia helioscopia</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	450 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır.

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Glyphosate izopropilamin tuzu, Diflufenican, Docusate Sodium, Propane-1,2-diol

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H315** Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261** Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Tırpan®

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	G:9	F1:12	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-------	-----------------------------

250 g/l Glyphosate aside eşdeğer Glyphosate IPA tuzu + 40 g/l Diflufenican

KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR	Tavşan salatası (<i>Lapsane communis</i>) Tavşanbıyığı (<i>Poa annua</i>) Adi salkım otu (<i>Poa trivialis</i>) Düğün çiçeği (<i>Ranunculus repens</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) İmamkavuşu (<i>Senecio vulgaris</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Kaba tüylü fiğ (<i>Vicia hirsuta</i>) Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	450 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır.
TURUNÇGİL	Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sürünücü horozibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	400 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü ile hazırlanan karışımı hedef yabancı otlara püskürtünüz. Uygulama esnasında civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.
- Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız. Sulandırma sonrası bekletmeden hemen kullanınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Tırpan®

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	G:9	F1:12	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-------	-----------------------------

250 g/l **Glyphosate aside eşdeğer Glyphosate IPA tuzu + 40 g/l**
Diflufenican

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde kullanılır. Geç dönemde yapılacak uygulamalar hem ani etkiyi azaltır hem de kalıcı etkiyi olumsuz yönde etkiler. Ürün su ile seyreltikten sonra yaygın spreyleme cihazları ile birlikte tüm yüzeye uygulanır. Optimum etkinlik için bitki ve toprak yüzeyinin tamamen ilaçla kaplanması gerekmektedir. Uygulama 1-3 bar basınçlı sırt pompaları ile yapılabilir. Daha büyük alanlar için hidrolik basınçlı spreyleme cihazları gereklidir. Optimum kontrol için uygulamadan sonra en az 6 saat tercihen 24 saat kuru hava şartları gereklidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Tırpan adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G:9 ve F1:12** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Tırpan'ın** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G:9 ve F1:12 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ve gübreler ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com