

agrobest

TURATO®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu C1:5 K3:15 HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

350 g/L Metamitron + 150 g/L Ethofumesate

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Gün, Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası :

Ruhsat tarihi ve numarası: 24.04.2025/13526

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre/Güvenli Bekleme Süresi (Gün)
ŞEKER PANCARI	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Dikenli Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	Çıkış sonrası 1.Uygulama 200 ml/da Şekerpancari tam kotiledon aşamasında Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde başlanır. 2.Uygulama 200 ml/da İlk ilaçlamadan 7-10 gün sonra yaşayan veya tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır. 3.Uygulama 200 ml/da İkinci ilaçlamadan 7-10 gün sonra yaşayan veya tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.	90 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. İlaçlama normu 20-40 L/da'dır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

24 Nisan 2025

Rev.004-1224

-Önce etiketi okuyunuz.

-Evde kullanmayınız.

-Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

-Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

-İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.

-KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Dinlenme sıcaklık ve temiz hava sağlayın. Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın.

Yutulması halinde; Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın. Kusturmaya çalışmayın.

Cilt ile teması halinde; Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. Ciltte kalan parçaları temizleyin. Hemen bol su ile yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Hemen üzerine bol su akıtın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Bir ambulans çağırın ve bu talimatları yanınıza alıp su akıtmaya devam ederek hastaneye götürün. Hemen tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net miktar: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Metamitron, Ethofumesate, Monopropilen glikol

ZARARLILIK İŞARETİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.

P330 Ağızınızı çalkalayın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

EUH401

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşala ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYIN

agrobest

agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 001 001 001

Mehmet BAŞER
Teknik Kıdemli Müdür

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

TURATO bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile 3 uygulama şeklinde kullanılır. 1. uygulamadan sonra ot çıkışı olmasa dahi 2. ve 3. uygulamalara devam edilmelidir.

Normal şartlar altında tüm şeker pancarı çeşitleri **TURATO'** ya çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken bitki koruma ürünlerine karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararları gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu daha da kötüleştirir. Bu durumlarda şekerpancarına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM NÖBETİ

Hasattan sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle kışık buğday olmak üzere sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek bitkinin ekim tarihi arasında ortalamanın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işleme önerilir. Sonrasında patates ve mısır ekilecekse derin toprak işleme önerilir. Tarlayı erken bozma durumunda 15-20 cm derinlikte bir toprak işleme yapıldıktan sonra şeker ve hayvan pancarı ile mısır ve patates ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **TURATO** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C1:5 ve K3:15** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TURATO'** nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C1:5 ve K3:15** hariç) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

agrobest
GRUP

TURATO®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C1:5	K3:15	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-------	-----------------------------

350 g/L Metamitron + 150 g/L Ethofumesate

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisidir.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi V.N. 008 01 1000

Mehmet BAŞER
Teknik Kıdemli Müdür



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

24 Nisan 2025