

Zucronal® of

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	C _{1,5} ; N ₈	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----------------------------------	-----------------------------

112 g/L Ethofumesate +91 g/L Phenmedipham +71 g/L Desmedipham

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
-EVDE KULLANMAYINIZ.
-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görmeye neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde, maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde, bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Ciltle teması halinde, kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. En az 10 dakika boyunca su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde, kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Ethofumesate , Phenmedipham , Desmedipham

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Hazırlanan mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış mahlülü aynı gün içinde kullanınız.
- Tıkanmış memeleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası : (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
ŞEKER PANCARI	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
	Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Bambul otu (<i>Heliotropium europaeum</i>) Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)	250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) İtalyan siğirdili (<i>Anchusa azurea</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Yatık sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophi</i>) Şifa otu (<i>Erigeron canadense</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Yabani bamyâ (<i>Hibiscus trionum</i>) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Adi soda otu (<i>Salsola kali</i>) Süpürge otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>) Kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>)	350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde

Zucronal® of

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	C _{1,5} ; N ₈	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----------------------------------	-----------------------------

112 g/L Ethofumesate +91 g/L Phenmedipham +71 g/L Desmedipham

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L. olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır..

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şekerpancarı kotiledon-2 yaprak döneminde iken bitki koruma ürününe karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml'den fazla kullanmayınız ve KATLAMA İLAÇLAMA YAPMAYINIZ. Bitki koruma ürününü kullanırken, şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz. **ZUCRONAL OF**, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır. Hava sıcaklığı 25 °C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara bitki koruma ürünü atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ZUCRONAL OF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C_{1,5} ; N₈** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ZUCRONAL OF 'in** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C_{1,5} ; N₈ harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San. Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com