






KAYISI İLAÇLAMA PROGRAMI

KAYISININ FENOLOJİK DÖNEMLERİ

| | Hastalık/Zararlı/ Yabancı Ot | Dinlenme Dönemi - Kasım, Aralık, Ocak | Tomurcuk Kabarma Dönemi - Şubat | Pembe Tomurcuk Dönemi - Şubat | Çiçeklenme Başlangıcı - Mart | Tam Çiçeklenme Dönemi - Mart | Çiçek Taç Yapraklarının Döküldüğü Dönem - Nisan | Meyve Gelişimi Dönemi - Mayıs, Haziran | Olgun Meyve Dönemi - Haziran, Temmuz |
|-------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|
| HASTALIKLAR |  Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>) | | | | Bestkur®25 WP , Solemnity®, Bestdodine® 500 SC , Rizoclean® | | | | |
| |  Yaprak Delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>) | | | | | | Best Captan® 50 WP , Bestdodine® 500 SC , Gurador® ,Luther®76 WG | | |
| ZARARLILAR |  Erik Koşnili (<i>Sphaerolecanium prunastr</i>) | | | | | | Navigator® | | |
| |  San-Jose Kabuklubiti (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> = <i>Diaspidiotus perniciosus</i>) | | | | | | Goldamiral®5 EC | | |
| |  Şeftali Filiz Güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>) | | | | | | | Bisect®20 SC , Nivathion® 60 EC | |